

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. • Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Αποφύγετε την ελεύθερως αέραιη του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας. «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 5 λεπτά τουλάχιστον και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση εισπνοής, μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

Μη χορηγείτε τίποτα στον παθόντα και μη προκαλέσετε εμετό σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Ειδικό αντίδοτο δεν υπάρχει. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777.

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδροβίους οργανισμούς να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** μέχρι τα σώματα των επιφανειακών υδάτων για τους οποίους ανήκει.

Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** μέχρι μη γεωργική γη για τους οποίους ανήκει και **5 μέτρα** για τα απειλικά και τα λαχανικά αγρού.

Προκειμένου να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα, μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει διακυλιδραζίνες περισσότερες από 2 με 3 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά. **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Οικοποιοίσιμα Αμπέλια, 14 ημέρες, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Επιτραπέζια Αμπέλια, Σταφίδες: 7 ημέρες, Τομάτα - Πιπεριά (Θερμοκηπίου): 1 ημέρα. **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια στην αρχική απαρτία της συσκευασίας, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο. **ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΗΝΤΑ:** —

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό νερό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ανατίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.**

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας



Dow Dow AgroSciences

Gladiator™

240SC

ENTOMOKTONO

Methoxyfenozide (μεθόξυφenoζαΐν)

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: methoxyfenozide 24% β/ο
(χημική ομάδα διακυλιδραζινών)
βοηθητικές ουσίες 76,83% β/β

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου που καταπολεμά τις προνύμφες λεπιδοπτερων σε διάφορες καλλιέργειες.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 14439/15-5-2013

Περιεχόμενο: 400 κ. εκ.

Κάτοχος της άδειας: Dow AgroSciences Export S.A.S., Γαλλία.
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, Τηλ: 210-6860130,
www.basf-agro.gr

™ Trademark of the Dow Chemical Company ('Dow') or any affiliated company of Dow.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το GLADIATOR 240 SC είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των διακυλιδραζινών. Καταπολεμά τις προνύμφες των λεπιδοπτερων σε εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, μανταρινιά), μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά), πυρηνόκαρπα (βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά), αμπέλι και τομάτες και πιπεριές θερμοκηπίου. Το methoxyfenozide είναι ρυθμιστής της ανάπτυξης των εντόμων και δρα ως μηλική της ορμόνης έκδυσης της εκδυσόνης, στις προνύμφες των λεπιδοπτερων. Λόγω της δόμησης του methoxyfenozide στη θέση-δέκτη της εκδυσόνης, προκαλείται πρόωγη και ατελής έκδυση, με αποτέλεσμα το θάνατο του εντόμου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να γίνει καλή διαβροχή του φυλλώματος.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού)
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά): Φυλλοκίστης (*Phyllocnistis citrella*). Δόση: 40 κ.εκ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, στοχεύοντας στους νέο-εκπυσσόμενους βλαστούς. Μίγμα με βερινό πολύτο σε δόση 300-500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200 λίτρα/στρέμμα. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10 ημέρες. **Μένιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** 2. **Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά):** Καρποκάμψ (*Carposcra pomonella*), Φυλλοδέτης (*Adoxophyes orana*), Φυλλορύκτης (*Lithocolletis* sp. – Δευτερεύουσα δόση). Δόση: 40 κ.εκ. Πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη εναπόθεσης των ωών (περίπου 7 ημέρες από την έναρξη της σύλληψης των ακμίων στις φερομονικές παγίδες) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Μεσοδιάστημα εφαρμογής 14-21 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-180 λίτρα/στρέμμα. **Μένιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** 3. **Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά):** Φυλλοδέτης (*Adoxophyes orana*). Δόση: 40 κ.εκ. Πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη εναπόθεσης των ωών (περίπου 7 ημέρες από την έναρξη της σύλληψης των ακμίων στις φερομονικές παγίδες) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Μεσοδιάστημα εφαρμογής 14-21 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-125 λίτρα/στρέμμα. **Μένιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** 3. **Αμπέλι (Ποικιλίες επιτραπέζιες, οινοποιήσιμες και σταφίδες):** Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*, συν. *Polychrosis botrana*). Δόση: 40 κ.εκ. Πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη εναπόθεσης των ωών (περίπου 7 ημέρες από την έναρξη της σύλληψης των ακμίων στις φερομονικές παγίδες) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Μεσοδιάστημα εφαρμογής 14-21 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Μένιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** 3. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

• Το φυτοπροστατευτικό προϊόν GLADIATOR 240 SC μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε προγράμματα IPM (Integrated Pest Management).

• Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Για την ίδια καλλιεργητική περίοδο σε μια καλλιέργεια το GLADIATOR πρέπει να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Αποφύγετε τη διαδοχική χρήση του GLADIATOR σε καλλιέργειες που έχει ήδη γίνει εφαρμογή με σκευάσματα που περιέχουν tebufenozide (MIMIC). - Χρησιμοποιείστε όλες τις δυνατότες καλλιεργητικές τεχνικές καθώς και φυσικές και βιολογικές μεθόδους για τον έλεγχο των εχθρών (παρακολούθηση των πτήσεων των ενηλικών και προστασία των ωφελώνων αρθροπόδων), έτσι ώστε να μειωθεί η ασκούμενη πίεση επιλογής για ανθεκτικότητα, από τις εφαρμογές των εντομοκτόνων. - Αποφύγετε την εφαρμογή του GLADIATOR σε περισσότερες από 2 με 3 συνεχόμενες γενιές των εχθρών στόχων κατ' έτος. - Αποφύγετε την χρήση εντομοκτόνων της ομάδας των διακυλιδραζινών για την εξάλειψη εκτεταμένης μη ελεγχόμενης προσβολής.