

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Το υλικό και οι περιέκτες του θα πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. • Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλείτε εμετό. Ζητήστε τη συμβουλή γιατρού. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Εάν εμφανισθεί ερεθισμός ζητήστε την συμβουλή οφθαλμίαστρου. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

Μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες.

**ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.**

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Κρεμμύδι: 60 μέρες, λοιπές καλλιέργειες: 21 μέρες. **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση του. Γεμίστε το ψεκαστικό κατά τα ¾ με νερό και προσθέστε τη δόση που χρειάζεται. Ξεπλύνετε πολλές φορές τα κενά δοχεία και ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστικό εξοπλισμό και ξεπλύνετε το εσωτερικό του με καθαρό νερό. Αφήστε το νερό να κυκλοφορήσει στο σύστημα για 10 λεπτά τουλάχιστον και έπειτα ψεκάστε τα νερά του ξεπλύματος. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας. **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Στην αρχική του εφαρμοσμένη συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



Dow Dow AgroSciences



**Οxyfluorfen (οξυφλουορφέν)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)**

Εγγυημένη σύνθεση: Οxyfluorfen 48% β/ο
(χημική ομάδα διφαινυλαιθέρες),
Βοηθητικές ουσίες 58.4% β/β

**Ζιζανιοκτόνο ετήσιων πλατύφυλλων
και αγρωστωδών ζιζανίων**



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ,
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

• Προορίζεται μόνο για
επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 7779 / 30-5-2006

Περιεχόμενο: 500 κ.εκ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Dow AgroSciences Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή,
τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

TM Trademark of the Dow Chemical Company ('Dow') or any affiliated company of Dow.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός του εδάφους με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη από δύο (2) atm. Ψεκασμός σε λωρίδες κοντά στο έδαφος από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Για ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια ⁽¹⁾.
Αγρωστώδη ζιζάνια: Αγριάδα, Αιματόχορτο, Αλεπονουρά, Βέλιουρας από σπόρο, Ήρα, Κύπερη, Μουχρίσα, Σετάρια.

Πλατύφυλλα ζιζάνια: Αγριοβαμβάκι, Αγριομελίτζα, Αγριοτομάτα, Αντράκλα, Βερόνικα, Βλήτο, Δωδεκάνθη, Ελευσίνη, Ζωχός, Λουβουδιά, Μαρτιάκος, Μικρή τσουκνίδα, Οξάλις, Ραπανάδα, Στελλάρις, Τάτουλας, Τριβόλι, Φυσαλίδα.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60 λίτρα ανά στρέμμα για όλες τις συνιστώμενες καλλιέργειες.

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπφρουτ, Κιτριά), Μη-λοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Νεκταρινιά, Κορομηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά), Αμπέλι ⁽²⁾ (Σαφίδες, Οινόπτοιζοι, Επιτραπέζια), Ελιά: Συστήνεται 1 εφαρμογή προφύτρων κατά 250 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα. **Μελιτζάνα, Λάχανο, Κουνουπίδι:** Συστήνεται 1 εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση με 125-150 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Ακολουθεί κατάκλιση. **Κρεμμύδι ⁽⁴⁾:** Συστήνεται 1 εφαρμογή με 75 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα, μεταφύτευτικά ως προς την καλλιέργεια στο στάδιο των 3-4 φύλλων (στο κρεμμύδι από σπόρο) ή εντός 2 ημερών από τη φύτευση (στο κρεμμύδι από κοκκάρια). **Αγινάρα:** Συστήνεται 1 εφαρμογή με 150 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα, προ της βλαστήσεως του ξηροφύτου. **Ηλιανθος ⁽³⁾:** Συστήνεται 1 εφαρμογή με 50 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα, μετά τη σπορά και πριν το φύτευμα της καλλιέργειας. **Βαμβάκι:** Συστήνεται 1 εφαρμογή με 50-150 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα πριν το φύτευμα της καλλιέργειας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου μέχρι τα 2-4 φύλλα. Τα ζιζάνια *Calendula arvensis* (Καλέντουλα) και *Rumex* spp (Λάπαθα) είναι ανθεκτικά στο GOAL. 2. Το αμπέλι πρέπει να είναι ηλικίας πάνω από 3 χρόνια και να είναι υποστηλωμένο ή αναρριχώμενο, γιατί αν είναι σε πολύ μικρή απόσταση από το έδαφος υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας. 3. Στον ηλιανθο δόση μεγαλύτερη από 60 κ.εκ./στρέμμα, δρο φυτοτοξικά. 4. Στο κρεμμύδι: να χρησιμοποιείται μόνο στο κρεμμύδι που προορίζεται για παραγωγή ξηρών βολβών. Να μην εφαρμόζεται με κρύο και υγρό καιρό. 5. Η εφαρμογή του να γίνεται σε ποτισμένο έδαφος. 6. Να μη γίνεται δεύτερη εφαρμογή τον ίδιο χρόνο.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Στις καλλιέργειες που δεν συνιστάται μπορεί να προκαλέσουν φυτοτοξικότητα ακόμα και τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού. Στον ηλιανθο προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν γίνει υπέρβαση της δόσης. Στο κρεμμύδι συνήθως παρατηρείται και κνέκρωση των άκρων των φύλλων, που όμως δεν έχει επιπτώσεις στην παραγωγή, γιατί είναι παροδική. Η φυτοτοξικότητα αυτή είναι πιο έντονη όταν ο καιρός είναι κρύος και υγρός. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΤΕΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:** Αποφεύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη. Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. Αν ρυπαρθούν νερά αρδύσεως, να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση. Μη ψεκάζετε όταν φυσάει. Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Να μη συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:** Μη σπέρνεται και μη φυτεύεται άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν δέκα (10) μήνες από την εφαρμογή του.