

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.
 - Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
 - Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
 - Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
 - Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. "Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό".
 - Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
 - Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
- Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η΄ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια ανεκαστή ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης Πρώτης Βοήθειας – Αντίδοτο

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά.

Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό αν ο ασθενής είναι ανίσθητος ή έχει απασμούς. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:



Dow Dow AgroSciences



ζιζανιοκτόνο

Γκραντόρ

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: 2,4-D οξύ: 60% β/ο (υπό μορφή 2,4-D 2- αθκυλο έξυλο εστέρας (EHE): 90,5% β/ο)

Βοηθητικές ουσίες: 13,48% β/β

Εκλεκτικό δισυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού και αραβόσπου.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

- Ερεθίζει το δέρμα.

- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 7993 / 29-10-2012 / 31-12-2015

Κάτοχος της έγκρισης:
Dow AgroSciences Export SAS, Γαλλία
Mancor Polo, Batiment B, Zac du Font de l' Orme 1
790, avenue du Docteur Donat
06254 Mouguine Cedex-France
e-mail: FTSALI@DOW.COM



Υπεύθυνος επικοινωνίας -
Υπεύθυνος για την διάθεση στην Ελλάδα:
ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Τηλεφών 32
ΤΚ 542 49 – Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310311377/Φαξ: 2310334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com

®Trademark of the Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Περιεχόμενο: 600 κ.εκ.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος
		κ.εκ. σκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Σπάρη Κριθάρι	Πλατύφυλλα ζιζάνια*	50-100	20-40	Μεταφυτευτική εφαρμογή κατά την περίοδο του αδεκρύματος, έως τον πρώτο κύμβο και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων.	1
Αραβόσπος	Πλατύφυλλα ζιζάνια*	50-100	20-40	Μεταφυτευτική εφαρμογή στο στάδιο 3-6 φύλλων του αραβόσπου και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων.	1

• Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ευαίσθητα ζιζάνια: *Abutilon theophrasti* (αγριομπταχιά), *Anagallis arvensis* (αναγallis), *Amaranthus retroflexus* (τραχύ βλήτο), *Bifora radians* (μπιφόρα), *Chenopodium album* (λουβουδά), *Cirsium arvense* (κίρσιον), *Convolvulus arvensis* (περιπλοκάδα), *Lamium amplexicaule* (δωδεκάνθη), *Papaver rhoeas* (κοινή παπαρούνα), *Raphanus raphanistrum* (ραπανάδα), *Sinapis arvensis* (άγριο σινάπι), *Solanum nigrum* (αγριοτοματιά).

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: *Datura stramonium* (τάτουλας), *Galium aparine* (μεγαλόκαρπη κολλητήδα), *Polygonum aviculare* (πολυκόμμη), *Polygonum persicaria* (αγριοπτεριά), *Veronica persica* (βερνικα).

Παρατήρηση: Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του σταδίου ανάπτυξης και της πυκνότητας των ζιζανίων.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4-D δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση στους μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και των ριζών και τελικά τη νέκρωση των φυτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2 atm, με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε πάλι με άφθονο νερό.

Συνδισαιτικότητα: –

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Σπάρη, κριθάρι: 60 ημέρες, Αραβόσπος: μη εφαρμοσμένο.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκαταστεί:

- Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλαμπόκι που προορίζεται για την παραγωγή σπόρου.

- Για την αποφυγή ζημιών σε γεωπονικές ευαίσθητες καλλιέργειες να αποφεύγεται η διασπορά σταγονιδίων, θα πρέπει να εφαρμόζεται με άπνοια, χαμηλή πίεση (2 ατμόσφαιρες) και με θερμοκρασίες όχι πάνω από 30°C.

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- Συνιστάται εφαρμογές χαμηλής πίεσης (χαμηλότερης από 2 ατμόσφαιρες) για την αποφυγή μεταφορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε γεωπονικές καλλιέργειες.
- Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ζεστές, εφαρμόστε το κατά τις βραδινές ώρες.
- Χρησιμοποιείτε ξεχωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- Χρησιμοποιείτε επίπεδα ακροφύσια (flat fan) κατά την εφαρμογή.
- Μην ρυλάνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό ή γεωπονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- Μην ρυλάνετε λίμνες, ρυάκια, κανάλια, ή υδατοσυλούς με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.