

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Taminco N.V., Pantserschipstraat 207, 9000 Gent, Królestwo Belgii, tel: 32 (9) 254 14 11, fax: 32 (9) 254 14 10, e-mail : info@taminco.com

Podmioty wprowadzające środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. **Agrosimex Sp.z o.o.**, Goliany 43, 05-620 Błędów,
tel.:(48) 668 04 71, fax : (48) 668 04 86, e-mail: agrosimex@wp.pl
2. **AGROKON Sp. z o.o.**, ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax.: 63 248 87 66, e-mail: agrokon@interia.pl
3. **AGRO-BAKAŁARZEWO Sp. z o.o.** ul. Polna 3, 16-423 Bakałarzewo, tel.: 87-569 43 06, fax: 87 569 40 52; e-mail: agrobak@suwalki.com.pl
4. **Ciech S.A.**, ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa, tel.: (22) 639 15 84, fax: (22) 639 15 98 e-mail: elzbieta.browarek@ciech.waw.pl
5. **JAWal & M Sp. j.**, R.Z. Murawiec, ul. Polna 17, 89-115 Mroczna, tel./fax: 52-385 63 36, e-mail: jawalm@wp.pl
6. **Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "CHEMIROL" Sp. z o.o.**, ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, tel.: (52) 318 88 45, fax: (52) 318.88.46, e-mail: piotrk@chemirol.com.pl
7. **Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa**, ul. Spółdzielców 16, 62-500 Konin, tel.: (63) 242 10 23, fax. : (63) 245 36 35, e-mail: spzrko@pro.onet.pl
8. **Osadkowski SA**, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, tel. 71 314 6454, fax.: 71 314 6465, e-mail : centrum@osadkowski.com.pl
9. **Agro-Biznes Sp. j.**, Sularz-Rudnicki, ul. Myśluborska 56, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel./fax.: 95 731 42 24, e-mail: agro_biznes@op.pl


**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

THIRAM GRANUFLO 80 WG

Zawartość substancji aktywnej:

tiuram/disulfid tetrametylotiuramowy/ (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 80%.

Zezwolenie MRiRW nr R -47/2010 z dnia 18.05.2010 r.



Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu - stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
3. W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
 - 25 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania wczesnego w uprawie jabłoni i brzoskwini;
 - 16 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania późnego w uprawie jabłoni i brzoskwini;
 - 2,5 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania w uprawie truskawki.

I OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i jagodników przed chorobami grzybowymi.

II ZAKRES STOSOWANIA

1. ROŚLINY SADOWNICZE

A) JABŁOŃ

parch jabłoni

Zalecana dawka: 3 kg/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo od fazy różowego pąka co 7-14 dni do początku fazy dojrzewania owoców i nasion.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów: 4.

B) BRZOSKWINIA

kędzierzawość liści brzoskwini

Zalecana dawka: 3 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od późnej jesieni do wczesnej wiosny tj. od opadnięcia liści do fazy nabrzmiewania pąków co 7-14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów: 3.

C) TRUSKAWKA

szara pleśń

Zalecana dawka: 4 kg/ha (bez względu na stosowaną do opryskiwania aparaturę).

Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha.

Termin stosowania: Zabiegi przeprowadzać w czasie kwitnienia truskawek. Pierwsze opryskiwanie wykonać na początku kwitnienia, gdy 10% kwiatów jest w stadium białego pąka, następne co 7 dni, aż do momentu, gdy z 10% kwiatów opadną płatki korony.

Maksymalna liczba zabiegów: 3.

UWAGI:

1. Środek słabiej działa w niskich temperaturach.
2. W okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko przed wieczorem, po zakończeniu dziennego lotu pszczół.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji

JABŁOŃ - 35 DNI,

BRZOSKWINIA – 42 DNI,

TRUSKAWKI – 7 DNI.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość. Odważoną

ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Chronić przed dziećmi.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia skóry.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.

- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA

W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04
Kraków – (12) 411-99-99
Lublin – (81) 740-89-83
Łódź – (42) 657-99-00
Poznań – (61) 847-69-46

Rzeszów –(17) 866-40-25
Sosnowiec –(32) 266-11-45
Tarnów –(14) 631-54-09
Warszawa –(22) 619-66-54
Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji -.....

Zawartość netto

Nr partii -.....