

ΜΕΣΤ ΝΟΥΔΡΟΝ 25EW

HADRON 25EW

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΜΠΕΛΙ: Καταπολεμά το ωίδιο με δόση 40κ.εκ /100 λίτρα ψεκ. υγρού και όγκο ψεκαστικού υγρού 80-100 λίτρα/στρέμμα. Δύο (2) εφαρμογές από το στάδιο της καρπόδεσης μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής ανά 12-14 ημέρες.

ΣΠΑΡΑΓΓΙ: Καταπολεμά τη σκωρίαση με δόση 100κ.εκ/100λίτρα ψεκ. υγρού και όγκο ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Τρεις (3) εφαρμογές μετά τη συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ανά 14 ημέρες.

Παρατηρήσεις: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρήση του HADRON 25EW μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs (υποομάδα των τριαζολών) ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs στην οποία ανήκει και το tebuconazole.

Τρόπος δράσης: Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (DeMethylation Inhibitors - DMIs)

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως

HADRON 25EW

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Φυτοτοξικότητα : Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Συνδυαστικότητα:-

Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή : Αμπέλι: 21 ημέρες, Σπαράγγι: 6 μήνες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και αφού τρυπηθούν προηγούμενως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενους χώρους, σε συνθήκη θερμοκρασία (σε ήπιο κλίμα). Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Ημ. Παρασκευής - Ημ. Λήξης - Αρ. Παρτίδας:
Βλέπε επί της συσκευασίας



HADRON 25EW

Tebuconazole (τεμπουκοναζόλ) 25%

ΓΑΛΑΚΤΟΜΑ ΛΑΔΙ ΣΕ ΝΕΡΟ (EW) Αριθμ. Εγκρ. Κυκλ.: 60078/18-10-2006
Εγγ.σύνθεση: tebuconazole 25% β/ο βιοβ. ουλίες 72,93% β/β Ημ. Λήξης 28-2-2014

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών) με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (βασιδιομύκητες, ασκομύκητες, δευτερομύκητες)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΤΟΞΙΚΟ

Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιεχόμενο
40 κ.εκ.

Κάτοχος της έγκρισης-Παρασκευαστής-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Εργοστάσιο παρασκευής: CHEMINOVA A/S, ΔΑΝΙΑ
P.O. BOX 9, DK-7620 Lemstrup, ΔΑΝΙΑ
Εργοστάσιο συσκευασίας-Διανομή:



ΑΘΗΝΑ: Φάσμα 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. Θυρά 1203, BL ΠΕ Θ, 57022 Σινός, τηλ. 2310.797.807
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Σινιάδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008
e-mail: info@hellafarm.gr

HADRON 25EW

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ● Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ● Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. ● Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. ● Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια

" Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης."

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτα: - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα αρκετές φορές με νερό ή γάλα. Να μην προκληθεί εμετός. Να μη δοθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αμέσως αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Οδηγίες για το γιατρό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση κατάποσης συνιστάται πλύση στομάχου ή/και λήψη ενεργού άνθρακα. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793 777**

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.