

ΠΕΔΙΟ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα (υπαίθρου ή θερμοκηπίου), Αγγούρι, κολοκύθι (υπαίθρου ή θερμοκηπίου), Μαρούλι (υπαίθρου ή θερμοκηπίου), Φασολάκι: για Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*) με δόση 10-100 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 10-20 κ.εκ./ στρέμμα. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 12. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 20-100. Ψεκασμός φυλλώματος λίγο πριν ή/και κατά την εκκόλαψη των αυγών του πράσινου σκουληκιού. Απαιτούνται 2-3 εφαρμογές ανά γενιά. Η 1η εφαρμογή εξαρτάται από τις μετεωρολογικές και γεωγραφικές συνθήκες. Στια καλλιέργειες υπαίθρου επανάληψη εφαρμογής κάθε 8 ηλιόλουστες ημέρες (2 μερικώς ηλιόλουστες ημέρες αντιστοιχούν σε 1 ηλιόλουστη). Στο θερμοκήπιο επανάληψη ανά 14 περίπου ημέρες. Για την 2η-3η γενιά χρησιμοποιήστε τη μέγιστη δόση (20 κ.εκ./στρ.)

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός κάλυψης φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το απαιτούμενο νερό. Ανακινήστε καλά το σκεύασμα πριν τη χρήση του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο και ξεκινήστε την ανάδευση.

Καθορισμός ψεκαστήρα: Μετά την εφαρμογή αδειάστε το βυτίο του ψεκαστήρα και ξεπλύνετε το καλά με καθαρό νερό μαζί με όλα τα μέρη του ψεκαστικού. Αδειάστε τελείως το βυτίο και πλύνετε με νερό. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

Τρόπος δράσης: Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των νεαρών προνυμφών του πράσινου σκουληκιού *Helicoverpa armigera*. Το προϊόν είναι ιός του τύπου των κοκκίωνσεων εξειδικευμένος για το *Helicoverpa armigera*. Δρα μέσω της κατάποσης. Στις προσβεβλημένες προνύμφες παρατηρείται αρχικά έλλειψη αντίδρασης σε εξωτερικά ερεθίσματα, μαλακό σώμα και διακοπή της τροφικής δραστηριότητας. Ημβανείς προνύμφες παρατηρούνται 4-6 ημέρες από την μόλυνση ενώ θάνατος των προνυμφών παρατηρείται μετά την 7η ημέρα από την μόλυνση. Από το ρευστοποιημένο σώμα των νεκρών προνυμφών ελευθερώνονται κοκκία του ιού που είναι ικανά να μολύνουν άλλες υγιείς προνύμφες.

Προστασία των καταναλωτών (Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή): Όλες οι καλλιέργειες 3 ημέρες **Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες και χρήσεις.

Αρ. πιστοίος-Ψυ. Παρασκευής-Ψυ.Λήξης: βλείτε ανα μέρος της φιάλης

HELICOVEX^{sc}

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
(ιός του τύπου των κοκκίωνσεων εξειδικευμένος για το *Helicoverpa armigera*) 44,8%

Εγγυημένη σύνθεση: *Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus* (HeartNPV) 44.8% β/β (7.5 x 10¹⁰ ενεργοί κοκκίοι/L)
Βοηθητικές ουσίες: 55.2 % β/β

Αρ. Εγκρ. Κυκλ.: 14362/13-04-2011 , Ψυ. Λήξης: 13-04-2014

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των νεαρών προνυμφών του πράσινου σκουληκιού *Helicoverpa armigera*.

Το προϊόν είναι ιός του τύπου των κοκκίωνσεων εξειδικευμένος για το *Helicoverpa armigera*. Δρα μέσω της κατάποσης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΗΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Περιεχόμενο: 200 κ.εκ.

Παρασκευαστής - Εργαστήριο παρασκευής - Εργαστήριο συσκευασίας: Andermatt Biocontrol AG, Ελβετία
Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:  **κελλαφορμ**

ΑΘΗΝΑ: Αιόλινη 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900-9
ΒΕΖ. ΝΙΚΗ: Ταχ. Βύρλα 1203, Βλ/ΠΕ 6, 57022 Σιάδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Σινιάδα Αγ. Ιωάννης 853 00 Τηλ.: 22380.22.008-9

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές - Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.
Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας συμβουλευτείτε άμεσα γιατρό (βλέπετε την ετικέτα αν είναι δυνατό). Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να απακλειστεί:-Το προϊόν είναι ευαίσθητο στην υπεριώδη ακτινοβολία γι' αυτό είναι προτιμότερο να εφαρμόζεται το βράδυ ή αργά το απόγευμα. - Χρησιμοποιήστε νερό με pH 5-8. Σε διαφορετική περίπτωση χρησιμοποιήστε κατάλληλα ρυθμιστικό διάλυμα. - Κατά την εφαρμογή, τα φυτά δεν πρέπει να είναι υγρά λόγω βροχής ή δροσας. - Εξασφαλίστε καλή και ομοιόμορφη διαβροχή ολόκληρου του φυτού.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο δοχείο του ψεκαστικού) και στη συνέχεια αφού κατασφραγούν προηγούμενος με τσίμπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενεργειακής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Όταν διατηρείται στην αρχική απαροβίαστη συσκευασία του στο ψυγείο (θερμοκρασία 4-6° C), το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια. Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (30° C), το προϊόν είναι σταθερό για τουλάχιστον 2 βδομάδες. Μπορεί να αποθηκευτεί και σε συνθήκες κατ'αμύνης.