

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΞΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπ φρουτ-Λεμονιά-Μανταρινιά-Πορτοκαλιά): Δόση: 65-110 γρ./100 λίτρα νερό, με 200-250 λίτρα ψεκ.υγρό/στρ. Κορυφοξήρα, Ανθράκνωση, Σεπτορίωση. Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών. Εφαρμογές πριν την έναρξη των βροχών και μετά από χαλάζι ή παγετό. **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ**: Δόση: 165-200 γρ./100 λίτρα νερό, με 100-150 λίτρα ψεκ.υγρό/στρ. Κορύνεο. Στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο, μόλις πέσουν τα φύλλα, και το χειμώνα, πριν την έκπτυξη των ξυλοφόρων οφθαλμών. Εξέλικση κορμού και κλάδων. Εάν υπάρχουν ευνοϊκές για το βακτήριο συνθήκες, συνιστάται επανόληψη της εφαρμογής στην αρχή της άνοιξης. **ΚΑΡΥΔΙΑ**: Ανθράκνωση, Κηλίδωση φύλλων και καρπών. Δόση: 135-200 γρ./100 λίτρα νερό, με 100-150 λίτρα ψεκ.υγρό/στρ. Οι εφαρμογές αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. **ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ**: Δόση: 135-295 γρ./100 λίτρα νερό, με 100-200 λίτρα ψεκ.υγρό/στρ. Φουζικηάδιο, Σεπτορίωση, Φαϊά σήψη. Εφαρμογές το φθινόπωρο, πριν την πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πράσινης κορυφής. Βακτηρίωση, Βακτηριακό κάψιμο. Στις περιοχές, όπου ενδημούν οι ασθένειες, συνιστώνται δύο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. **ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ**: Δόση: 165-205 γρ./100 λίτρα νερό, με 100-120 λίτρα ψεκ.υγρό/στρ. Κορύνεο. Στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές: α) το φθινόπωρο, μόλις πέσουν τα φύλλα, και β) στο τέλος του χειμώνα, πριν την διόγκωση των οφθαλμών. Φαϊά σήψη. Εφαρμογές κατά τη διόγκωση των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή. **ΚΕΡΑΣΙΑ**: Κορύνεο, Προσβολή από *Pseudomonas syringae*. Δόση: 165-210 γρ./100 λίτρα νερό, με 100-120 λίτρα ψεκ.υγρό/στρ. Στις περιοχές, όπου ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές: α) το φθινόπωρο, μόλις πέσουν τα φύλλα, και β) στο τέλος του χειμώνα, πριν την διόγκωση των οφθαλμών. Φαϊά σήψη. Εφαρμογές κατά τη διόγκωση των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή. Βακτηριακό έλκος. Σε περιοχές, όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. **ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια & Οиноποιήσιμα σταφύλια)**: Περονόσπορος, Ανθράκνωση, Βακτηριακή νέκρωση. Δόση: 105-270 γρ./100 λίτρα νερό, με 50-150 λίτρα ψεκ.υγρό/στρ. Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. **ΕΛΙΑ**: Κυκλόκονιο. Δόση: 295 γρ./100 λίτρα νερό (φθινόπωρο) ή 135 γρ./100 λίτρα νερό (άνοιξη) με 150-300 λίτρα ψεκ.υγρό/στρ. Στις περιοχές, όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές από τις αρχές του φθινοπώρου μέχρι τις αρχές της άνοιξης. Γλοιοσπόριο. Δόση: 295 γρ./100 λίτρα νερό, με 150-300 λίτρα ψεκ.υγρό/στρ. Γίνονται δύο εφαρμογές: Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. Καρκίνωση. Δόση: 295 γρ./100 λίτρα νερό (φθινόπωρο) ή 135 γρ./100 λίτρα νερό (άνοιξη), με 150-300 λίτρα ψεκ.υγρό/στρ. Εφαρμογές μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό. **ΤΟΜΑΤΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ (υπαίθρου & θερμοκηπίου)**: Δόση: 310 γρ./100 λίτρα νερό (βαριά προσβολή) ή 135 γρ./100 λίτρα νερό (ελαφρά προσβολή), με 50-100 λίτρα ψεκ.υγρό/στρ. Περονόσπορος. Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφυτών και επανόληψη ανά 10-14 ημέρες. Κηλδοσπορίωση, Σεπτορίωση, Ανθράκνωση. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανόληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Βακτηρίωση. Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών φυτών μέχρι την καρποδέση. **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Αγγούρι-Κολλοκύη-Πεπόνι-Καρπούζι) (υπαίθρου & θερμοκηπίου)**: Περονόσπορος, Ανθράκνωση, Κηλδοσπορίωση, Βακτηρίωση. Δόση: 135 γρ./100 λίτρα νερό, με 50-100 λίτρα ψεκ.υγρό/στρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανόληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΦΑΣΙΟΛΙ**: Δόση: 165-170 γρ./100 λίτρα νερό, με 50-80 λίτρα ψεκ.υγρό/στρ. Κερκοσπορίωση. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανόληψη ανά 7-14 ημέρες. Βακτηρίωση. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανόληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΣΕΛΙΝΟ**: Σεπτορίωση, Κερκοσπορίωση. Δόση: 165-170 γρ./100 λίτρα νερό, με 50-80 λίτρα ψεκ.υγρό/στρ. Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επανόληψη ανά 7-10 ημέρες, ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΑΡΑΧΙΔΑ**: Κερκοσπορίωση. Δόση: 225 γρ./100 λίτρα νερό, με 60 λίτρα ψεκ.υγρό/στρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανόληψη ανά 7-10 ημέρες, ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΠΑΤΑΤΑ**: Περονόσπορος, Ανθράκνωση. Δόση: 225 γρ./100 λίτρα νερό (βαριά προσβολή) ή 135 γρ./100 λίτρα νερό (ελαφρά προσβολή), με 50-100 λίτρα ψεκ.υγρό/στρ. Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επανόληψη ανά 10-14 ημέρες, ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΓΛΑ**: Κερκοσπορίωση. Δόση: 335 γρ./100 λίτρα νερό, με 40 λίτρα ψεκ.υγρό/στρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανόληψη ανά 10-14 ημέρες, ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:

Καρυδιά-Κερασιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Αμπέλι-Τομάτα-Πιπεριά-Κολλοκυνθοειδή-Πατάτα-Ζαχαρότευτλο (4), Εσπεριδοειδή-Αμυγδαλιά-Μηλιά-Αχλαδιά-Βερικοκιά-Φασόλι-Σέλινο-Αραχίδα (3), Ελιά (2).

ΥΔΡΟΣΤΑΡ:

Μικητοκτόνο, βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του με ψεκαστικό μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Παρατηρήσεις:

1) Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τα Μηλοειδή και οι μεγάλες, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. 2) Το εύρος του όγκου του ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας. 3) Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. 4) Οι προληπτικές εφαρμογές γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις καλλιέργειες αμπελιού, εσπεριδοειδών, μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, πατάτας, ελιάς και λαχανικών υπό κάλυψη, να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προεidenοποιήσεων.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά-Καρυδιά): 28 ημέρες. Εσπεριδοειδή-Αμπέλι (επιτραπέζια & οινόποιήσιμα σταφύλια)-Ελιά-Πατάτα-Αραχίδα-Ζαχαρότευτλο: 21 ημέρες. Τομάτα (υπαίθρου): 10 ημέρες. Τομάτα (θερμοκηπίου): 7 ημέρες. Λαχανικά (υπαίθρου & θερμοκηπίου): 7 ημέρες. Μηλοειδή-Πυρηνόκαρπα: Μπ εφαρμοσiμο (καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή).

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες αμπελιού Delaware, Rosette, Niagara και Concord. Είναι φυτοτοξικό στα Πυρηνόκαρπα μετά την έκπτυξη των φύλλων. Επαναλαμβανόμενες χρήσεις στα μηλοειδή, μπορεί να προκαλέσουν καστανό χρωματισμό. Στη Μηλιά, οι εφαρμογές να σταματούν όταν η πράσινη κορυφή είναι μήκους 1 εκ. Γενικά, να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση. Ο κίνδυνος φυτοτοξικότη-τας αυξάνεται στις χαμηλές θερμοκρασίες (<5°C) και σε υγρασία.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα, όξινα σκευάσματα, με σκευάσματα που περιέχουν thiram και με πολυσυμφιδια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκoi), μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥ-ΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται κλειστό, στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο δροσερό και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

HidroStar®

40WG

Μεταλλικός χαλκός 40% Βρέξιμοι κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση: **Μεταλλικός χαλκός 40% β/β**
(σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού)
Βοηθητικές ουσίες 32,21% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλιοφ.: 60195/14.07.2008

Μυκητοκτόνο-Βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ



Κάτοχος της έγκρισης-Παρασκευαστής:
IQV Italia S.r.l. - Ιταλία
Υπεύθυνος Επικοινωνίας-Υπεύθυνος
για την τελικήσυσκευασία και σήμανση:
Σταύρος Σπηλιάδης - Αθήνα

Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:
Industrias Quimicas del Valles. - Ισπανία

Συσκευαστής-Διανομέας
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 211205559
Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



Μέλος του



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. •Φοράτε κατάλληληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. •Πλύνετε τα ρούχα της δουλειάς μετά τον ψεκασμό. •Πλύνετε τα χέρια και τα ακάθαρτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πиеίτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). *Σε περίπτωση κατάποσης*, χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλη-τηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντι-μετώπιση. *Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια*, πλύ-νετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντιδοτο:** Πενικιληαμίνη.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ή ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
ΒΛΑΒΕΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΕΚΑΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ



02/2009-9