

Σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Σε κανονικό σύστημα αμειψιπορίας, για ένα χρόνο μπορούν να σπαρθούν όλες οι πιθανές καλλιεργείες με την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση του εδάφους.

Της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε σε ψεκασμένες περιοχές πριν στεγνώσουν εντελώς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με σχήσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Χρησιμοποιήστε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας. • Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τα σάχματα των επιφανειακών υδάτων.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρυνθείτε στον καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό μετά από σημαντική έκθεση. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν βραχεί με το σκεύασμα. Πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και εάν ο ερεθισμός του δέρματος παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα πάρα πολύ καλά με νερό και καλέστε αμέσως γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και καλέστε αμέσως γιατρό.**

Για το γιατρό: Μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά συμπτώματα. Αρχική θεραπεία συμπτωματική και υποστηρικτική. Σε περίπτωση που έχει καταποθεί μεγάλη ποσότητα λάβετε τα παρακάτω μέτρα:

Πλύση στομάχου και ακολούθως χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα (carbo medicalis) και θειικό Νάτριο. Απέκκριση με πρόκληση αλκαλικής διούρησης. Έλεγχος των νεφρών, του ήπατος και του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Υπό κανονικές συνθήκες παραμένει σταθερό για περισσότερο από δύο χρόνια.

Διανομέας:

Bayer Ελλάς ABEE
Συρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100



Bayer CropScience

N 07 3808 06 GR 06117928 A



hussar[®] maxx^{WG}

Εγγυημένη σύνθεση: εναιωρηματοποίησης κόκκοι
a.Mesosulfuron-methyl: 3 % β/β (ισοδύναμο σε mesosulfuron 2.9% β/β)
β.Iodosulfuron-methyl-sodium: 3 % β/β (ισοδύναμο σε Iodosulfuron 2.8% β/β)
Αντιμυκητογόνος παράγοντας:
Metenpyr-diethyl 19 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 83,9 % β/β

Αριθ. Έγκρ. Υπουργ. Αγροτ. Ανάπτ. & Τροφ.:
7788/24.07.2006

Καθ. βάρος 600γρ. e

Ζιζανιοκτόνο

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες.

Xi

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάτοχος της έγκρισης, υπεύθυνος για την τεχνική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE
Παρασκευαστής – Συσκευαστής:
Bayer CropScience GmbH Γερμανίας

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμός της φυλλικής επιφάνειας με ακροφύσιο τύπου σκούπας

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά. Στο τέλος προστίθεται η απαιτούμενη ποσότητα biopower.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Αρχίστε το καθαρίσμα του μηχανήματος αμέσως στο χωράφι. Ελέγξτε και καθαρίστε τα ακροφύσια και τα φίλτρα. Πολύ σημαντικό είναι να καθαριστεί το πρώτο φίλτρο μετά το δοχείο του ψεκαστικού, αλλά και τα υπόλοιπα φίλτρα του μηχανήματος. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού στο 10% της χωρητικότητάς του με καθαρό νερό, και καθαρίστε τα εσωτερικά τοιχώματα και τους σωλήνες πολύ καλά. Ψεκάστε τα απόνερα σε αψέκαστο σημείο του χωραφιού. Επαναλάβετε το τελευταίο βήμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σκληρό και μαλακό σπάρι. Είναι διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονουλεϊνών. Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξεγαλακτικού Απορροράται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανίοντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Μερικές μέρες μετά τον ψεκασμό η ανάπτυξη των καταπολεμωμένων ζιζανίων έχει ήδη σταματήσει και τα πρώτα συμπτώματα αρχίζουν να εμφανίζονται. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομαδών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πεδίο εφαρμογής: Σπάρη (μαλακό και σκληρό)

Αγρωστώδη: Αγριόβρωμη (*Avena sterilis*), Ηρα πολύνανθη (*Lolium multiflorum*), Φάλαρη (*Phalaris paradoxa*), *P. brachystachis*), Μήλιο (*Millium vernale*), Πόα (*Poa annua*).

Πλατύφυλλα: Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), Αγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), Μικρόκαρπη κολλητιδα (*Galium spurium*), Μεγαλόκαρπη κολλητιδα (*Galium aparine*), Ανθέμιδα (*Anthemis arvensis*), Πολυκόμυτι (*Polygonum aviculare*), Στελλάρια (*Stellaria media*), Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*) Αγριομαργαρίτα (*Chrysanthemum segetum*)

Μέτρια ευαίσθητα: Αγρωστώδη: Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*)

Πλατύφυλλα: Μπιφόρα (*Bifora radicans*), Βερνίκια (*Veronica persicaria*)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ:

• 20-25 γρ /στρέμμα (maximum) με προσθήκη 0,2% Biopower (Με τη χαμηλή δόση των 20 γρ/στρέμμα καταπολεμούνται τα ζιζάνια Μίλιο, Φάλαρη, Ανθεμιδα, Αγριο Σινάπι και Στελλάρια. Η δόση του Biopower σε κάθε περίπτωση παραμένει ίδια.)

• 83 γρ. (maximum) / 100 λίτρα ψεκ. υγρού.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Μεταφυτρωτικός ψεκασμός ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια. Από το στάδιο των 2 φύλλων της καλλιέργειας μέχρι το στάδιο των 1-2 κόμβων.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: • Να μη εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από οποιοδήποτε είδους καταπόνηση, όπως π.χ. ξηρασία, θερμός αέρας κ.λπ. • Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλωρίωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν περιβαλλοντικές συνθήκες μη ευνοϊκές για την ανάπτυξη της καλλιέργειας όπως χαμηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένες βροχοπτώσεις ή εναλλαγές νυχτερινού παγετού με υψηλές θερμοκρασίες ημέρας. • Να αποφεύγεται ο ψεκασμός φυτών που είναι υγρά λόγω βροχής ή ατμοσφαιρικής υγρασίας. • Η αποτελεσματικότητα του HUSSAR Maxx δεν επηρεάζεται αν ακολουθήσει βροχή 2-4 ώρες μετά τον ψεκασμό. • Κατά τον ψεκασμό προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε να μη μεταφέρονται σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες πλατύφυλλες καλλιέργειες.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

Σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση καταστροφής της καλλιέργειας μπορεί να γίνει επανασπορά μόνο με σπάρη και εφόσον προηγηθεί άροση του εδάφους.