



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.



ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / γυμνές φλόγες / θερμές επιφάνειες. Μην καννίζετε.

Αποφεύγετε να αναπνέετε τα εκνεφώματα. Φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Μην τρώτε, πίνετε ή καννίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.



Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μία



Ikarus® 2,5EC

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων.

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Deltamethrin2,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες97,13% β/β
Αρωματικός διαλύτης.....Νάφθα

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αρ. Παρτίδας ή Αποστολής:	ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία παραγωγής:	

A.A.D.A.: 14475/11.03.2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 500 κ.εκ.

Κάτοχος της Άδειας:

Sharda Europe b.v.b.a.

Josef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διδραση στην αγορά:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559

Θεσσα/νικη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία, Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Μέλος του



01/A/2014-4

ημέρα, εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.

Για να προστατεύσετε υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μίαν ασέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις δεινδρώδεις καλλιέργειες και την ελιά, 20 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού και 10 μέτρων για τα λαχανικά και τις λιπνές καλλιέργειες.

Για να προστατεύσετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα, να αφήσετε μίαν ασέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

Για να προστατεύσετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων.

Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντιόδο:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό στο ντους.

Αντιόδο: Δεν υπάρχει ειδικό αντιόδο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777



ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΙΚΑΡΟΥΣ: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής-στομάχου κατά μυζητικών και μασπτικών εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους ιόντων νατρίου στις προσυναντικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού)-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΞΕΠΕΡΙΔΟΙΔΗ (Πορτοκαλιά-Μανιτάρια-Λεμονιά-Γκρέιφ φρουτ-Νεραντζιά): Αφίδες, Δόση: 30-50. Λεκάνιο, Μύγα μεσογειού, Αλευρώδης, Δόση: 50. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΜΗΛΟΙΔΗ (Μηλιά-Αχλαδιά):** Καρπόακα μηλιάς, Αφίδες, Ψύλλοι, Ανθόνιμφοι, Μηλοδόνη, Κηκιδόμυγες, Θρίπες, Δόση: 30-50*. Φυλλήθοδες, Δόση: 35. Ψύλλοι Αχλαδιάς, Δόση: 50. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. Ψώρα Σαν Ζοζέ, Δόση: 50-75. Εφαρμογή το καλοκαίρι, κατά κιντών μορφών. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερκοκιά-Ροδάκινα-Νεκταρίνα-Κερασιά-Δαμασκηνά):** Φυλλήθοδες, Ανόρσια, Δόση: 35. Ραγολέττα ή μύγα κερασιάς, Δόση: 40-50. Μύγα μεσογειού, Δόση: 50. Αφίδες, Καρπόακα δαμασκινάς, Δόση: 30-50. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. Ψώρα Σαν Ζοζέ, Δόση: 50-75. Εφαρμογή το καλοκαίρι, κατά κιντών μορφών. **ΑΜΠΕΛΙ*:** Ευδεμία, Δόση: 50 (1η γενιά), 50-70 (2η και 3η γενιά). Κοχυλίδα, Δόση: 50-70. Τζτζικάκια, Αφίδες, Πυραλίδα, Τσιγαρολόγος, Κοφτοσκούληκα, Δόση: 50. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΕΛΙΑ:** Λάκος, Δόση: 50. Εφαρμογή σύμφωνα με τις συστάσεις των ακμίων στις παγίδες, Λεκάνιο, Θρίπες, Δόση: 50. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. Πυρηνωτήριτες, Δόση: 30 (ανθόβ.), 50 (καρποβ.). Εφαρμογή στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενιά) και αμέσως μετά την καρπόδεση (καρποβία γενιά), μετοξύ ωσθεσίας και εκκόλλησης των ων και σύμφωνα με τις συστάσεις των ακμίων στις φερομονικές παγίδες. **ΦΡΑΟΥΛΑ:** Αφίδες, Δόση: 50. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΚΡΕΜΜΥΔΙ-ΠΡΑΣΟ-ΚΑΡΟΤΟ:** Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδης, Κοφτοσκούληκα, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΤΟΜΑΤΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (υπαίθρου)-ΠΙΠΕΡΙΑ (υπαίθρου+θερμοκηπίου):** Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες, Δόση: 50. Βρωμύδες, Δόση: 30. Αλευρώδης, Δόση: 70 (Θ). Κοφτοσκούληκα, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. (Υ). Εφαρμογές μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΤΟΜΑΤΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (θερμοκηπίου):** Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες, Δόση: 50. Βρωμύδες, Δόση: 30. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΑΓΓΟΥΡΙ (υπαίθρου+θερμοκηπίου):** Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Δόση: 50. Κοφτοσκούληκα, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. (Υ). Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΛΑΧΑΝΟ:** Πιερίδα, Μαμέστρα, Πηούζα, Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα, Κοφτοσκούληκα, Αφίδες, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Πηούτση, Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΜΑΡΟΥΛΙ (υπαίθρου):** Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα, Άητης, Αφίδες, Δόση: 50. Κοφτοσκούληκα, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΣΠΑΝΑΚΙ:** Αφίδες, Σποντόπτερα, Μαμέστρα, Άητης, Δόση: 50. Κοφτοσκούληκα, Δόση: 35 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΣΕΛΙΝΟ-ΡΟΚΑ:** Αφίδες, Σποντόπτερα, Μαμέστρα, Άητης, Δόση: 50. Κοφτοσκούληκα, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΟΞΥΡΙΑ (Φασόλι-Κουκιά):** Πράσινο ακουλήκι, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα, Δόση: 25-30 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΜΠΕΖΕΛΙ:** Αφίδα των μπιτζελιών, Σιτόνα, Δόση: 25 κ.εκ./στρ. Αφίδα των κουκιών, Κάμπιες, Θρίπες, Κοφτοσκούληκα, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΑΓΚΙΝΑΡΑ:** Κασοίδα, Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Προντένια, Αφίδες, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΣΠΑΡΑΓΓΙ:** Αφίδες, Θρίπες, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:** Δίπτερα, Κολλέμβοι, Δόση: 30-50. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΠΑΤΑΤΑ:** Δορυφόρος, Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Σποντόπτερα, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Ρόδινο ακουλήκι, Πράσινο ακουλήκι, Δόση: 50-70 κ.εκ./στρ. Τζτζικάκια, Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Σποντόπτερα, Θρίπες, Λύγκος, Κοφτοσκούληκα, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΚΑΠΝΟΣ:** Αφίδες, Θρίπες, Κοφτοσκούληκα, Επίρριξ, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΣΑΚΚΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:** Άητης, Κοφτοσκούληκα, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Σκαθόρι, Κλεονός, Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ***:** Πυραλίδα, Σεζάμιο, Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Θρίπες, Κοφτοσκούληκα, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Δορυφόρος, Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΣΙΤΑΡΙ-ΚΡΙΘΑΡΙ:** Αφίδες, Θρίπες, Κοφτοσκούληκα, Δόση: 25-30 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΜΗΔΙΚΗ:** Αφίδες, Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή 5-10 ημέρες μετά την κοπή. **ΣΟΠΑ:** Άητης, Κοφτοσκούληκα, Νεζάρα, Δόση: 30 κ.εκ./στρ. Αφίδες, Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΕΛΙΟΚΡΑΜΒΗ:** Άητης, Meligetes spp. Δόση: 30 κ.εκ./στρ. Αφίδες, Σκαθόρι, Δόση: 50 κ.εκ./

στρ. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υπαίθρου+θερμοκηπίου-Φυτόρια):** Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδης, Μηλοδόνη, Κάμπια γαρφαράου, Δόση: 50. Φυλλήθοδες, Δόση: 35. Αλευρώδης (trialeurodes vaporariorum), Δόση: 70. Εφαρμογή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): Εσπεριδοειδή-Αμυγδαλιά-Μηλιά-Αγκινάρα-Σπαράγγι-Μανιτάρια (100), Μηλοειδή (100-140 / 100 για ψύλλοι αχλαδιάς και ψώρα Σαν Ζοζέ), Πυρηνόκαρπα (100-140 / 100 για ψώρα Σαν Ζοζέ), Ελιά (100-140), Μαρούλι υπαίθρου-Φρούδια (50-100), Κρεμμύδι-Πράσοο-Καρότο (40-50), Τομάτα-Μελιτζάνα-Πιπεριά (60-100 Υ, Πιπεριά (60-140 Θ), Τομάτα-Μελιτζάνα (Θ) (60-100 / 60-140 για Βρωμύδες), Αγγούρι (60-100 Υ / 60-140 Θ), Λάχανο-Σακκαρότευτλα (50), Σπανάκι-Σέλινο-Ρόκα (70), Όσπρια-Πατάτα-Αραβόσιτος (60), Βαμβάκι (30-50), Καπνός-Καλλιωπιστικά (50-100), Καλλιωπιστικά/Αλευρώδης trialeurodes vaporariorum (70), Σιτάρι-Κριθάρι (20-40), Μηδική-Σόγια-Ελαιοκράμβη (40).

Μείνιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος - Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Εσπεριδοειδή-Πυρηνόκαρπα-Ελιά-Μανιτάρια-Σακκαρότευτλα (1), Μηλιά-Αχλαδιά για ψώρα Σαν Ζοζέ (1), Μηλοειδή-Λάχανο-Σπανάκι-Σέλινο-Ρόκα-Όσπρια-Μηλιά-Βαμβάκι-Μηδική-Σόγια-Ελαιοκράμβη (2 / 14 ημέρες), Αμυγδαλιά-Φρούδια-Κρεμμύδι-Πράσοο-Καρότο-Πατάτα (3 / 14 ημέρες), Τομάτα-Πιπεριά-Μελιτζάνα (Υ)-Αγγούρι (Υ+Θ)-Μαρούλι (Υ)-Αγκινάρα-Σπαράγγι-Καπνός-Καλλιωπιστικά (3 / 7 ημέρες), Τομάτα-Πιπεριά-Μελιτζάνα (Θ) (4 / 7 ημέρες), Αραβόσιτος (3 / 7-14 ημέρες), Σιτάρι-Κριθάρι (1-2 / 21 ημέρες).

Παρατηρήσεις: *ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα Μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ.υγρού πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκ. υγρού (100 λίτρα/στρ.), έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει υπέρβαση του Μείνιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων. ****Δεν επιτρέπεται η συλλογή αμπελόφυλλων, στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν. *******Η εφαρμογή του προϊόντος στον αραβόσιτο οδηγεί στη μείωση των επιβλαβών των ποτατοειδών, ως αποτέλεσμα επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia spp.* και *Sesamia spp.*

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: •Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων, ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απαιτούμενες απαράφτες για αποτελεσματικό έλεγχο. •Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο, με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. •Το σκεύασμα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. •Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές του προϊόντος. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα, με διαφορετικό τρόπο δράσης. •Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών-στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου ηλέκας, ειδικά σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. •Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνουν με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Εσπεριδοειδή-Βαμβάκι-Σιτάρι-Κριθάρι-Αραβόσιτος-Ελαιοκράμβη-Σακκαρότευτλα: 30 ημέρες. Μηδική: 15 ημέρες.

Σόγια: 14 ημέρες.

Μηλοειδή-Πυρηνόκαρπα-Αμυγδαλιά-Ελιά-Κρεμμύδι-Λάχανο-Φασόλι-Κουκιά-Μηλιά-Πράσοο-Πατάτα-Καπνός: 7 ημέρες.

Φρούδια-Τομάτα-Μελιτζάνα-Πιπεριά-Αγγούρι-Μαρούλι-Σπανάκι-Σέλινο-Ρόκα-Αγκινάρα-Σπαράγγι-Μανιτάρια-Καρότο: 3 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργείες και δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Διατηρήστε το στην αρχική, απαράβατη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες κάτω των 40°C. Σε αυτές τις συνθήκες, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.