

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: • Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτηρίφες. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρηματοποιείτε. • Σε περίπτωση εποήφης με τα μάτια πλύνετε τα μάσεως με νερό και ζητήστε ιατρική συμβούλιο. • Φράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και αυστηρό πρωτότυπο ματαρά προσώπου. • Σε περίπτωση κατασύρσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβούλιο και δεξέτε αυτό το δοχείο γη την επικέτα. «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης»

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση εποήφης με τα μάτια: Ζετάλνετε με άφθονο νερό. Συμβαλλείσθε γιατρόν αν ο ερεθίστης επωμένει.

Σε περίπτωση εποήφης με το δέρμα: Ζετάλνετε το λειρώμενό δέρμα με άφθονο νερό και σαπονάν.

Σε περίπτωση κατασύρσης: Δώστε 2 ποτήρια νερό και καλέστε γιατρό. Ποτού μη δινέται κάτι από το στόμα, σε στόμα που δεν έχει την αισθησηση του.

Σημείωση για τα γιατρά: Το σκεύασμα περιέχει πετρελαϊκό διαλύτη. Ιωας ενδέκονταν ελεγχόμενη πλάση στομάχου. Μπορεί να ποδηλεχθεί προσεκτική γαστρική πλάση κάτι που εξαρτάται από την κατασύρσηση ποσοτητάς.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Τοξέο για τους υδρόβιους οργανισμούς
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσηρεσίες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Το υλικό και ο περιέκτης του νω θευρεύθυνον κατά τη διάθεσή του επικίνδυνα απόβλητα.

Αποφύγετε την ελεύθερη επαφή του στο περιβάλλον. Αναφέρετε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδουλεύμαντος ασφαλείας.
ΜΗ ΡΥΠΑΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Οδηγίες για την ασφαλή απόδυνηση της συσκευασίας: Οι φάλες και τα δογεία ξεπλένονται υπό πίεση ώτι γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουν στο φεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρυπήμα, για τη διασφάλιση της μη περατέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία σύλλογης για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό, κλειστό και καλά αεριζόμενο χώρο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



Ημέρια παρασκευής / Αριθμός παρτίδας: Θέλετε άνω μέρος της φάλης



Dow AgroSciences

Indar™

5EW

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Fenbuconazole 5% w/w
(Φενυμποκαναζόλ) 5%

Εγγυημένη σύνθεση: Fenbuconazole: 5 % β/β
Βοηθητικούς ουσίες: 94,85% β/β

Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW) Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση



- Ερεθίζει τα μάτια
- Πίεσθαις κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατό τη διόρκεια της κύησης



ΦΥΛΑΞΕΤΟ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Κάτοχος της έγκρισης: Dow AgroSciences Export S.A.S., Γαλλία
Υπεύθυνος επικοινωνίας - Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:


ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΗΛ.2310 568656 • FAX.2310 798423 • e-mail: info@effthymiadis.gr

©™ Trademark of the Dow Chemical company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Περιεχόμενο:
250 Κ.Ε.Κ.

ΦΑΣΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΜΗΛΑ για Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis) στη δόση 60 κ.ε.κ./ 100 λίτρα νερού με 100-200 λίτρα φεκαστικού διαλύματος στρέμα. Εφαρμογή από το στάδιο της «ρόδηντς κορυφής» και εφόσον οι καρποίκες συνθήκες ενυδρών την ανάπτυξη της ασθενείας. Στις περιοχές που εφαρμόζεται σύστημα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι σχετικές συστάσεις των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ για Φαία σήμη (Malinella laxa) στη δόση 70 κ.ε.κ/100 λίτρα νερού με 100-150 λίτρα φεκαστικού διαλύματος στρέμα. Εφαρμογή στην αρχή της άνθησης μέχρι την πτώση των πετάλων, εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του ποδογόνου.

Για προστασία των καρπών κατά την αποθήκευση τους στη φυτεία εφαρμογή στη Ροδακινιά, Νεκταρινιά και Βερικοκιά στη δόση 100 κ.ε.κ/100 λίτρα νερό και Κερασιά 70 κ.ε.κ/100 λίτρα νερό μέχρι 3 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

ΑΜΠΕΛΙ για Όινο (Vitis vinifera) στη δόση 60 κ.ε.κ/100 λίτρα νερού με 50-150 λίτρα φεκαστικού διαλύματος στρέμα. Εφαρμογή πριν την άνθηση, όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ., και μέχρι της αλλαγή του χρώματος των παρύνων, και ανάλογα με ταν καρπών συνθήκες που επικρατούν.

ΚΟΛΑΚΟΥΛΙ, ΠΕΠΩΝΙ, ΑΓΓΟΥΡΙ για Όινο (Spiraeotheca fuliginea) στη δόση 120 κ.ε.κ/100 λίτρα νερό με 200-250 λίτρα φεκαστικού διαλύματος στρέμα. Γίνονται 2-3 φεκασμοί ανα καλλιεργητική περίοδο. Οι φεκασμοί που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνο εποφής, ή μυκητοκτόνα που δεν παραπομούν διασταύρωση απεικόνιση με τις τριαλές.

ΣΤΑΡΙ για Κωπανή ακωρίαση (Puccinia recondita) στη δόση 200 κ.ε.κ/ στρέμα με 40-60 λίτρα φεκαστικού διαλύματος στρέμα. Εφαρμογή στο στάδιο του ασθενείατος:

• Προληπτικές εφαρμογές φύσισον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των παθογόνων. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.
• Αποφυγή επεμβάσεων με Indar 5 EW μετά την εμφάνιση της προσβολής.

• Οι επεμβάσεις με το οκευόμα, πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης που δεν ανήκουν στον ομάδα των DMIs και δεν εμφανίζουν διασταύρωση με αυτή.
• Χρήση μόνο της εγκεριγμένης δοσολογίας.

• Ορθή εφαρμογή φεκασμών.
• Στο Αμέλι αποφυγή εφαρμογής του Indar 5 EW στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου.

Μέγατος ορθιμός φαρμάρων με Indar 5 EW στην εμφάνιση της προσβολής:
• Μήκος: 4/7-14 • Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά: 4/14, • Αμπέλι: 2/14 τουλάχιστον, Κολοκύθη, Πεπόνι, Αγγούρι: 3, • Στάρι: 1

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με φεκασμούς καλύψεως και στο στάδιο με πλήρη διαβροχή.
Τρόπος παρασκευής φεκαστικού υγρού: **Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση του.** Γεμίστε το δοχείο του φεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ανακινείστε το σκευάσμα καλά και αναδέσσοντας προσθέτεστο στο φεκαστικό τη συνισταύμενη δόση του σκευάσματος. Σύμπτωσης με το υπόλοιπο νερό συνεχίζονται την ανάδεση. Η ανάδεση του φεκαστικού διαλύματος φεκασμού.

Φυτοεξικότητα: Δεν έχει φατοτικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης.
Συνδυαστικότητα: Δεν αναγνύεται με αλκαλικής αντιδράσης σκευάσματα.

Τελευταία επεμβάση πριν τη συγκομιδή:
• Μηλιά, Αμπέλι: 28 μέρες,
• Ροδακινιά, Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Αγγούρι, Κολοκύθη, Πεπόνι: 3 ημέρες,
• Στάρι: 1 εφαρμογή στο στάδιο του ασθενείατος.