

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Μοκρά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμο-ποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή κοπνίζετε. •Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. •Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδο-μένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλό αερισμένο χώρο και προστατέψτε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση υποθερμίας καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα περιεμένα ρούχα και πλύντε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύντε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης και εφ’ όσον ο παθών έχει τις αισθήσεις του κολληθείτε σε επείγουσα ενεργό ανδράκα με μεγάλη ποσότητα νερού. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους. Μην προκαλέσετε εμετό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτω-ματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες. Σχετικά μη τοξικό για τα αρπακτικά έντομα και ακάρεα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

L171543 GREC/4R

Insegar®
25 WG

syngenta®

Fenoxycarb (καρβαμιδικό)

Υδατοδιασπερδόμενοι κόκκοι (WG)

Αρ. Ορίστ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ. Τροφ.: 1973/11-3-2003

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Fenoxycarb 25% β/β

Βοηθητικές ουσίες 74,23% β/β

Καρβαμιδικό εντομοκτόνο.

Ρυθμιστής αυξήσεως που δρα δι' επαφής και από στομάχιου.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε.
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΦΕΣ/ΚΗ ΒΙ ΠΕ, Φ. Σύνδεσ, Τηλ.: 231 0796940-3



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Product names marked ® or ™, the ALLMACE FRAME and SYNGENTA logo and the P, H, B, F, O, L, E, S logo are trademarks of a Syngenta Group Company

400 gr e

Τρόπος δράσης:
Εμποδίζει τη μεταμόρφωση των προνυμφών ή την εκκόλαψη των αυγών (ακόσμη και προνυμφόσχη δράση). Δεν έχει ακμαιοκτόνο δράση.

Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
• Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα 3/4 με νερό.
• Ρίχνουμε χωρίς προδιάλυση την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος.
• Αναδεύουμε καλά και συμπληρώνουμε μέχρι επάνω με νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:
Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό), καταστρέφονται με τριψύχιο ή σκόμιο αντίστοιχα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης και εναπομένοντα όλη σε σημείο συλλογής, για ανασύγκληση ή ανάκτηση ενέργειας.

Φυτοτοξικότητα:
Υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας σε καρπούς και φύλλα μερών ποικιλιών αχλαδιάς. Πριν από ευρεία χρήση σε συγκεκριμένη ποικιλία, κάντε δοκιμαστική εφαρμογή και μην υπερβείτε τις δόσεις.

Συνδυαστικότητα:
Ειδικά όταν χρησιμοποιείται στην αχλαδιά, να μην συνδυάζεται με ορυζήλας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευμένο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε όρθια θέση, ξηρά και καλά αεριζόμενο μέρος.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Εσπερίδοειδη (Λεμόνια, πορτοκαλιά, μανταρινιά): 45 ημέρες.
Ελίδς: 60 ημέρες.
Μήλο, Ροδόκκι, Αμύγδα: 20 ημέρες.
Αχλαδιά: 30 ημέρες.



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Εσπερίδοειδη (Λεμόνια, πορτοκαλιά, μανταρινιά): Για *Κηροπλάστη (Ceroplastes spp)* και *Λεκάριο (Saissetia oleae)* 20-40 γρ. οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60 γρ.οκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή με ψεκασμό των κινητών μορφών.

Μήλοειδη (Μήλο, Αχλαδιά): Για *Φυλλορύκτες (Phylloxera)* *confinella* *Ph. biancardella*, *Chemistostoma scitella* (*cydonia* spp) 50 γρ. οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75 γρ.οκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την έναρξη της εναπόθεσης των αυγών, που συνήθως συμπίπτει με το μέγιστο της πτήσης των ακμίων. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 μέρες.

Για *Φυλλοδέστες* 40 γρ. οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60 γρ.οκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα. Δύο ψεκασμοί εναντίον των προνυμφών του τελευταίου σταδίου. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 μέρες. Για *Καρπόκαψα (Cydia pomonella)* 40 γρ. οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60 γρ.οκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα. Με την έναρξη των πρώτων εναποθέσεων. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 μέρες. Για *Ψυλλήρα αχλαδιάς (Psylla pyri)* 100 γρ. οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 150 γρ.οκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα. Κατά την έναρξη μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού που ο πληθυσμός είναι ακόμα χαμηλός και δεν υπάρχει υπέρβαση των γενεών. Ιδιαίτερα κατά την έναρξη του σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 μέρες.

Για *Κοκκοειδή (Quadraspidiotus perniciosus)* 150 γρ. οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 225 γρ.οκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα. Όταν τα 2/3 του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 μέρες.

Ροδόκκι: Για *Φυλλοδέστες* 40 γρ. οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60 γρ.οκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα. Δύο ψεκασμοί εναντίον των προνυμφών του τελευταίου σταδίου. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 μέρες. Για *Κοκκοειδή (Quadraspidiotus perniciosus, Pseudalaspis pentagona)* 150 γρ. οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 225 γρ.οκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα. Όταν τα 2/3 του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 μέρες.

Αμύγδα: Για *Ευδεμίδα (Polyctrois botrana)* και *Καρυμύλλα (Euroscilla ambigua)* 20-40 γρ. οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60 γρ.οκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα. Με την έναρξη των πρώτων εναποθέσεων αυγών. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 μέρες.

Ελίδς: Για *Λεκάριο (Saissetia oleae)* 40 γρ. οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60 γρ.οκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή όταν το 65% του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια.

Παρατηρήσεις:

Οι προαναφερόμενες δόσεις, σε όλες τις καλλιέργειες, αφορούν σε ποσότητα 150 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα. Εάν ανά στρέμμα η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού είναι μεγαλύτερη, τότε πρέπει να ρυθμιστούν ανάλογα οι δόσεις ανά 100λίτρο.



Αρ. Παράστα:
Ημ. ήμ. Παραγωγή:

PE-AGI
925 096