

Imidan® 50 WP

Phosmet (φοσμέτ)

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση: Phosmet 50% β/β
(χημ. ομάδα φθαλιμιδίων)
Βοηθητικές ουσίες 47,37% β/β

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για μασητικά και μυζητικά έντομα με δευτερεύουσα δράση στα ακάρεα.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ,
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

• Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά. • Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό, χωρίς να το καταπιείτε. Χορηγήστε 200-300 κ.εκ. πόσιμου νερού. • Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα). • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Αν αναπνέει με δυσκολία, θα πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο από εκπαιδευμένο άτομο. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή μόνο εφόσον ο παθών δεν αναπνέει. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦ.: 1231/26-1-81

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1200 γραμ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Gowan Comércio Internacional e Servicos Limitada, Πορτογαλία.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ.Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, τηλ. 210-6860130, www.basf-agro.gr.
© Σήμα κατατεθέν Gowan Internacional.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό, χωρίς να το καταπιείτε. Χορηγήστε 200-300 κ.εκ. πόσιμου νερού.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Αν αναπνέει με δυσκολία, θα πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο από εκπαιδευμένο άτομο. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή μόνο εφόσον ο παθών δεν αναπνέει. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και ξεπλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Θειική ατροπίνη και 2 – PAM, με επίβλεψη γιατρού.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210-7793777**

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί 1 ημέρα μετά τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέχρι τη μέση σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό και δροσερό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2), τουλάχιστον, χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκισίμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Αριθ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.



Imidan® 50 WP

Phosmet (φοσμέτ)

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση: Phosmet 50% β/β
(χημ. ομάδα φθαλιμιδίων)
Βοηθητικές ουσίες 47,37% β/β

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για μασητικά και μυζητικά έντομα με δευτερεύουσα δράση στα ακάρεα.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ,
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

• Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά. • Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό, χωρίς να το καταπιείτε. Χορηγήστε 200-300 κ.εκ. πόσιμου νερού. • Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα). • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Αν αναπνέει με δυσκολία, θα πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο από εκπαιδευμένο άτομο. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή μόνο εφόσον ο παθών δεν αναπνέει. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦ.: 1231/26-1-81

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1200 γραμ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Gowan Comércio Internacional e Servicos Limitada, Πορτογαλία.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ.Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, τηλ. 210-6860130, www.basf-agro.gr.
© Σήμα κατατεθέν Gowan Internacional.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΧΡΟΝΟΣ, ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (γρ. στα 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού) **ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος με ψεκαστήρες κοινού όγκου και μπεκ τύπου κώνου. Σκόπιμο είναι ο ψεκασμός να γίνεται με συνεχή ανάδευση του φυλλώματος.

ΓΚΡΕΪΠ-ΦΡΟΥΤ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: *Muiça Μεσογείου (Ceratitis capitata)*, *Κόκκινη ψύρα (Aonidiella aurantii)*, *Ψευδόκοκκος (Pseudococcus citri)*. **Δόση:** 50. Συνιστώνται ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 200 λίτρα ανά στρέμμα.

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ: *Ανάρσια (Anarsia lineatella)*, *Καρπόκαψα (Cydia pomonella)*, *Οπλοκάμπη (Hortocampa brevis)*, *Φυλλοδέτες (Adoxophyes orana)*, *Φυλλορρύκτες (Phyllonorycter blancardella)*, *P. corylifoliae*, *Ψύλλα (Psylla pyri)*, *Βαμβάκδα (Diaspis pentagona)*, *Αιματόψειρα (Eriosoma lanigerum)*. **Δόση:** 120-140. Συνιστώνται ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα ανά στρέμμα.

ΚΕΡΑΣΙΑ: *Ανάρσια (Anarsia lineatella)*, *Καρπόκαψα (Cydia molesta)*, *Ανθονόμοι (Anthonomus ornatus)*, *Ρυγχίτης (Rhynchites bacchus)*. **Δόση:** 120. *Βαμβάκδα (Diaspis spp.)*. **Δόση:** 140. Συνιστώνται ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150-250 λίτρα ανά στρέμμα.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: *Ανάρσια (Anarsia lineatella)*, *Καρπόκαψα (Cydia molesta)*, *Φυλλοδέτες, Ανθονόμοι (Anthonomus ornatus)*, *Ρυγχίτης (Rhynchites bacchus)*, *Βαμβάκδα (Diaspis spp.)*. **Δόση:** 150. Συνιστώνται ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα ανά στρέμμα.

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: *Σεζάμια (Sesamia nonagrioides)*, *Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis)*. **Δόση:** 120. Συνιστώνται ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα ανά στρέμμα.

ΤΕΥΤΛΑ: *Κλεονός (Bothynoderes punctiventris)*. **Δόση:** 120. Συνιστώνται ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα ανά στρέμμα.

ΦΙΣΤΙΚΙΑ (χρήση ήσσονος σημασίας)*: *Σκώρος (Palumbina/Stathmopoda/Thyrsostoma gueirini)*, *Μικρολεπιδόπτερο (Tinea pistaciae)*. **Δόση:** 150. Συνιστάται ψεκασμός κάλυψης με την εμφάνιση της προσβολής. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα ανά στρέμμα.

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις ακόλουθες χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Για την καταπολέμηση των κοκκοειδών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με θερινό πολτό.
 - Να μην επαναχρησιμοποιείται πριν περάσουν 30 ημέρες από την προηγούμενη εφαρμογή.
 - Στα κοκκοειδή εφαρμόζεται όταν έχουμε το μέγιστο των κινητών προνυμφών, που συμπίπτει με το 60-65% της εκκόλυψης των αυγών.
- ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή τουλάχιστον για 14 ημέρες μετά την εφαρμογή του ψεκασμού.
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Κερασιά, Αραβόσιτος, Τεύτλα, Τριφύλλι: 28 ημέρες. Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 14 ημέρες. Φιστικιά: 30 ημέρες.
- ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες και τις δόσεις που συστήνεται η εφαρμογή του κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.