

# ISOMATE CTT

www.anthesis.gr

Περιεχόμενο:  
400 διαχυτήρες / φάκελο

## ΔΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑΣ ΣΕ ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΙΑ

Αριθμός Άδειας  
Διάθεσης στην Αγορά: 9067

Ημ/νία χορήγησης: 17-03-2014

Κάτοχος της άδειας:  
CBC (Europe) Srl, Via E. Majorana, 2,  
20834 Nova Milanese (MB) – Italia  
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:



Εμμανουήλ Μπενάκη 8, 14561 Κηφισιά  
Τηλ: 210 8012367 Fax: 2106233196

Παρασκευαστής του σκευάσματος:  
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd, Ιαπωνία

### Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

380 mg min / διαχυτήρας:  
(Ε,Ε)-8,10-Dodecadien-1-ol (54% β/β) +  
Dodecanol-1-ol (28.8%β/β) +  
Tetradecanol-1-ol (6.9%β/β)  
Βοηθητικές ουσίες 3,1%β/β

### Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής         | Στόχος                       | Σκευάσμα (Διαχυτήρες) / Στρέμμα | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Μηλιά, Αχλαδιά, Καρυδιά | Καρπόκαψα<br>Cydia pomonella | 50 Διαχυτήρες (2)               | Βλ. Σημ (1), (3) & (4)      | 1                                                    |

### Παρατηρήσεις:

- (1) Τοποθετείτε τους διαχυτήρες την άνοιξη, πριν την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμίων.
- (2) Ο αριθμός των διαχυτήρων/στρ. καθορίζεται ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή του οπωρώνα και την πίεση της προσβολής.
- (3) Στην περιμετρο του αγροτεμαχίου πρέπει να γίνεται συμπληρωματική ανάρτηση διαχυτήρων και επίσης, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση και πέρα από το αγροτεμάχιο.
- (4) Τοποθετήστε στο αγροτεμάχιο φερομονικές παγίδες παρακολούθησης (monitoring) και ελέγχετε κάθε εβδομάδα τις συλλήψεις. Ελέγχετε επίσης τους βλαστούς και τα καρπίδια κάθε 2 εβδομάδες.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής (δεν έρχεται σε επαφή με την καλλιεργεία).

### Προφυλάξεις:

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλυθείτε σχολαστικά με πολύ νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Μη χειρίζεστε άλλους τύπους φερομονών πριν και μετά την εφαρμογή, χωρίς να πλύνετε καλά τα χέρια σας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκευάσμα ή τη συσκευασία του.

**Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

### Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777

### Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται στην αρχική απαρτία συσκευασίας του, σε θερμοκρασία και ξηρό μέρος, σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C. Φυλάξτε το μακριά από τη θερμότητα, το ηλιακό φως και πιθανές πηγές ανάφλεξης. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθμός παρτίδας / ημερομηνία Παρασκευής: βλ. επί της συσκευασίας

