

#### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

«Φοράτε κατάλληλες μπότες και καπέλο με πλατύ γείσο κατά την εφαρμογή»

«Οι εργάτες να φορούν κατάλληλα γάντια σε περίπτωση που εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά το ψεκασμό»

#### Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Ξεπλύνετε αμέσως τα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ  
ΓΙΑ ΤΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από υγρασία.

ΗΜΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας



0412

# ΚΑΝΕΜΙΤΕ 15 SC

acequinocyl

(χημική ομάδα: παράγωγο ναφθοκινόνης)

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:

acequinocyl: 16,4% B/o  
βοηθ. ουσίες: 83,57% B/β

## Ακαρεοκτόνο

με δράση κυρίως μέσω επαφής  
και δευτερευόντως μέσω κατάποσης  
στα κινητά στάδια των ακάρεων.

Xi



**ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ**

• Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση  
σε επαφή με το δέρμα.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**  
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αριθ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 2182\_31-1-2011

**Περιεχόμενο 600 κ.εκ.**

Παρασκευαστής σκευάσματος: Agro-Kanesho Co., Ltd, Ιαπωνία  
Κάτοχος της έγκρισης - Εργοστάσιο συσκευασίας:



**Κ.Λ. Ευθυμιάδη οβ.ε.ε**

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• ΤΗΛ. 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

**ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Το acequinocyl είναι ακαρεοκτόνο με δράση κυρίως μέσω επαφής και δευτερευόντως μέσω κατάποσης στα κινητά στάδια των ακάρεων. Δρα στα μιτοχόνδρια με παρεμπόδιση της μεταφοράς ηλεκτρονίων.

#### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

**ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ:** για Κίτρινο και Κόκκινο τετράνυχο (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*) στη δόση 100-120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ.υγρού με 100-150 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα (Μέγιστη δόση: 180 κ.εκ./στρέμμα). Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (από την έναρξη της καρπόδεσης). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.

**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ:** για Κίτρινο και Κόκκινο τετράνυχο (*Tetranychus urticae*, *Panonychus citi*) στη δόση 100-120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ.υγρού με 200-250 λίτρα ψεκαστικού υγρού/ στρέμμα (Μέγιστη δόση: 300 κ.εκ./στρέμμα). Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (από την έναρξη της καρπόδεσης). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.

**ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ:** για Κίτρινο τετράνυχο (*Tetranychus urticae*) στη δόση 100-120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ.υγρού με 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού/ στρέμμα (Μέγιστη δόση: 120 κ.εκ./στρέμμα). Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται.

#### Παρατηρήσεις:

Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την πυκνότητα του πληθυσμού.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκάσμοι φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύουμε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού. Ρίχνουμε το διάλυμα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

#### Διαχείριση Ανθεκτικότητας:

- Να γίνεται χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για τον αποτελεσματικό έλεγχο των ακάρεων.
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και σε εναλλαγή με ακαρεοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Να εξασφαρίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της άνω και κάτω επιφάνειας των φύλλων με το ψεκαστικό υγρό.
- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εκθρών/στόχων έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιεργείες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Για τις καλλιεργείες της αχλαδιάς και της μελιτζάνας θερμοκηπίου συνιστάται δοκιμή φυτοτοξικότητας μικρής έκτασης.

#### ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

- Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδάκινια: 14 ημέρες
- Πορτοκαλιά, Μανταρινιά: 28 ημέρες
- Τομάτα, Μελιτζάνα θερμοκηπίου: 3 ημέρες