

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ (γρ./100 λίτρα νερό)-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπ φρουτ-Λεμονιές-Πορτοκαλιές-Μανταρινιές): Κομμίωση λαιμού. Δόση: **250-300**. Ένας ψεκασμός το μήνα, αρχίζοντας από την περίοδο της ενεργού βλάστησης, όταν ο καιρός είναι υγρός, ή ένας ψεκασμός στους 2-4 μήνες όταν έχουμε ξηρασία. Συνοδικά κάνουμε 3-4 ψεκασμούς το χρόνο (τέλος Απρίλη-Μάη, Ιούνιο και Σεπτέμβριο). Φυτόφθορα καρπών. Δόση: **250-300**. Ψεκάζουμε το φύλλωμα μία φορά το μήνα, αρχίζοντας μόλις αλληάξει το χρώμα (1-2 ψεκασμοί). **ΜΗΛΙΑ:** Φυτόφθορα λαιμού και και ριζών. Δόση: **250**. Ένας ψεκασμός το μήνα με 10-20 λίτρα ψεκαστικού υγρού/δένδρο. Συνοδικά γίνονται 3-4 ψεκασμοί στην περίοδο της ενεργούς βλάστησης (άνοιξη-αρχές καλοκαιριού). **ΑΜΠΕΛΙ:** Περονόσπορος. Δόση: **250-300**. Ψεκασμοί στα παρακάτω στάδια: α) Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., β) Μετά από 10 ημέρες, γ) Λίγο πριν την άνθηση και δ) Λίγο μετά τη γονιμοποίηση. **ΦΡΑΟΥΛΑ:** Σήψεις λαιμού. Δόση: **200-250**. Εμβάπτιση του ριζώματος για 15 λεπτά πριν τη φύτευση ή ένας φυλλοψεκασμός αμέσως μετά τη φύτευση με **400** γρ./100 λίτρα νερό/στρέμμα. Συνεχίζουμε με ένα φυλλοψεκασμό το μήνα, κατά την περίοδο που αναπτύσσεται ο μύκητας, με **250** γρ./100 λίτρα νερό (**350-400** γρ./στρέμμα). **ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ:** Περονόσπορος. Δόση: **300 γρ./στρ**. Ψεκασμοί που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται 2 φορές το μήνα. **ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:** Περονόσπορος. Δόση: **200-300**. Ψεκασμοί που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται 2 φορές το μήνα. **ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ:** Περονόσπορος. Δόση: **300-400**. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας, ψεκασμοί ανά 8-10 ημέρες. **ΑΓΓΟΥΡΙ-ΠΕΠΟΝΙ-ΚΑΡΠΟΥΖΙ:** Περονόσπορος. Δόση: **200-300**. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή εφόσον οι συνθήκες ευνοούν της εμφάνιση της ασθένειας, δύο (2) ψεκασμοί το μήνα με καλό ρούσιμο των φυτών. Σε περίπτωση έντονης προσβολής, συνιστάται ο ψεκασμός ανά 10ήμερο με τη μεγαλύτερη δόση. **ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ-ΛΑΧΑΝΟ-ΜΑΡΟΥΛΙ:** Περονόσπορος. Δόση: **60 γρ./τ.μ**. Γίνονται δύο (2) ριζοποτίσματα: ένα κατά τη σπορά και ένα πριν τη μεταφύτευση. **ΠΡΑΣΣΟ:** Περονόσπορος. Δόση: **300 γρ./στρ**. Ψεκασμοί που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται δύο φορές το μήνα. **ΠΑΤΑΤΑ:** Περονόσπορος. Δόση: **250-300**. Ψεκασμοί που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επαναλαμβάνονται δύο φορές το μήνα. **ΛΥΚΙΣΚΟΣ:** Περονόσπορος. Δόση: **250-300**. Δύο (2) ψεκασμοί: 1ος, όταν η βλάστηση έχει μήκος 5-10 εκ. και 2ος, όταν φθάσει 20-30 εκ. **ΚΑΠΝΟΣ:** Περονόσπορος. Δόση: **250-300**. Προληπτικοί ψεκασμοί που αρχίζουν μία εβδομάδα μετά το σταύρωμα των φυτών στο σπορείο και ψεκασμοί στο χωράφι κάθε 14 ημέρες στην περίοδο που υπάρχει κίνδυνος προσβολής. **ΚΩΝΟΦΟΡΑ:** Προσβολή από Phytophthora cactorum. Δόση: **250**. Ψεκασμός μία φορά το μήνα στη διάρκεια της ανάπτυξης (συνοδικά 3 ψεκασμοί). **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Φυτώρια-Σπορεία):** Φυτόφθορα. Δόση: **400 γρ./κυβ.μέτρο χώματος**. Εφαρμόζεται με ενσωμάτωση στο μείγμα χώματος. **10 γρ./τ.μ**. Ριζοπότισμα αμέσως μετά τη φύτευση ή μεταφύτευση. Επανάληψη μία φορά το μήνα.

Παρατηρήσεις:

1) Σε τομάτα, πεπόνι, αγγούρι, η μεγάλη δόση χρησιμοποιείται όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή σε ασθένεια που εκδηλώνεται. 2) Στη μηλιά, για τη φυτόφθορα λαιμού, συνιστάται επιπλέον η επάθειψη με πινέλο στο λαιμό του δένδρου με πυκνό διάλυμα **150-200** γρ./λίτρο νερού. 3) Στις καλλιέργειες αμπέλι, μηλιά, πατάτα και λαχανικά υπό κάλυψη, να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο:

Εσπεριδοειδή-Μηλιά-Αμπέλι-Φράουλα-Λαχανικά-Καπνός-Καλλωπιστικά (4), Κωνοφόρα (3), Λυκίσκος (2).

Κατάνγκα:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί φυλλώματος. Εμβάπτιση ριζώματος. Ενσωμάτωση σε τεχνικά υποστρώματα. Επάθειψη στο λαιμό του δένδρου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις, υπό τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δε συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν χαλκό, με ελαιοίδη σκευάσματα, με σκευάσματα που περιέχουν dicofoi, με σκευάσματα θείου υγρής μορφής καθώς και με διαφυλλικά λιπάσματα με βάση το άζωτο.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι-Μαρούλι-Λάχανο-Φράουλα: **14** ημέρες.

Αγγούρι: **1** ημέρα.

Λοιπές καλλιέργειες: **3** ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ/ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.

Katanga®
80WP

Fosetyl-AI (Φοσετίνη-Αη) 80%
Βρέξιμη σκόνη

Εγγυημένη σύνθεση: **Fosetyl-AI 80%** β/β
Βοηθητικές ουσίες: 16,67% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλ.οφ.: 6768/2.6.99

Ημ/νία Λήξης: 30.4.2011

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ



Παρασκευαστής του σκευάσματος:

Proplan - Plant Protection Company - Ισπανία

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσ/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Μέρος του



01/2007-5



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Μην αναπνέετε τη σκόνη. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. •Πλύνετε τα χέρια και τα ακάθικτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης, Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το κουτί ή την ετικέτα. Χορηγήστε στον παθόντα, εάν έχει τις αισθήσεις του, 2-3 ποτήρια νερό ή γάλα και μία κουταλιά σιρόπι Ipecac για να προκληθεί εμετός. Εάν δεν έχει προκληθεί εμετός σε 20 λεπτά, επαναλάβετε ακόμη μία φορά τη χορήγηση του σιροπιού. Διαφορετικά, προκαλέστε τον εμετό με το δάκτυλό σας. Μην προκαλείτε εμετό σε αναίσθητο άτομο. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** πλυνθείτε με νερό και σαπούνι. Σε όλη τις περιπτώσεις, Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτω-ματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι σακκούλες και τα σακκίδια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και μαζί με τα κουτιά, που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.