



Προσοχή

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.



ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατάλληλα γάντια κατά την εφαρμογή.
Φυλάσσεται κλειδωμένο.



Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη - Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλλες, σακίδια) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη

περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Περιέχει **mancozeb**. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων (για το αμπέλι) και 5 μέτρων (στην πατάτα) από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψτε τα αρθρόποδα να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων για το αμπέλι από μη γεωργική γη.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΚΑΤΑΝΓΚΑ ΜΑΝ:

Μίγμα ενός διασυστηματικού μυκητοκτόνου της ομάδας των οργανοφωσφορικών (fosetyl-AI) και ενός μυκητοκτόνου επαφής της ομάδας των διθειοκαρβαμιδικών (mancozeb), με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Το mancozeb δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία. Το fosetyl-AI δρα παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων αλλήλ και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών. Το προϊόν απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί φυλλώματος, με καλή διαβροχή των φυτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ (γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού)-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ: Περονόσπορος. Δόση: **300-500** με 30-70 λίτρα/στρ. Εφαρμογή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την έναρξη της προσβολής. Γενικά, γίνονται εφαρμογές στα στάδια: βλαστοί μήκους περίπου 10 εκ., λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.

ΠΑΤΑΤΑ: Περονόσπορος. Δόση: **300-500** με 30-80 λίτρα/στρ. Εφαρμογή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την έναρξη της προσβολής. Γενικά, γίνονται εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ

Katanga® MAN WP

Fosetyl-AI (Φοσετίνη-Αη) 35%
Mancozeb (Μανκοζέμπ) 35%
Βρέξιμη σκόνη

Εγγυημένη σύνθεση: **Fosetyl-AI** 35% β/β
Mancozeb 35% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 22,37% β/β

A.A.Δ.A.: 60347/08.02.2013

Μίγμα ενός διασυστηματικού μυκητοκτόνου της ομάδας των οργανοφωσφορικών και ενός μυκητοκτόνου επαφής της ομάδας των διθειοκαρβαμιδικών με προστατευτική και θεραπευτική δράση

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες



Κάτοχος της άδειας:
Proplan Plant Protection Company SL
c/Valle del Roncal 12, 28232 Μαδρίτη, Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο-Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:
Αμπέλι (3 / 10-14 ημέρες)
Πατάτα (3 / 15 ημέρες).

Παρατηρήσεις:

1) Η μεγάλη δόση χρησιμοποιείται όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή σε ασθένεια που εκδηλώνεται.
2) Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται τα προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:
30 ημέρες από την εφαρμογή.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Δεν συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα, με όξινα ή οξειδωτικά σκευάσματα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Αμπέλι: **28** ημέρες.
Πατάτα: **21** ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγρα- φόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ/ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
Βλέπε επί της συσκευασίας.



01/2013-10