

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. •Πλύνετε τα χέρια και τα ακάθιστα μέρη του σώματος πριν φάτε, πίνετε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. •Το υλικό και ο πε-ριέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. •Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο. •Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή το κενό σκευασμάς του. •Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια** πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα** πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. **Αν υπάρχει αναπνευστικό πρόβλημα**, ο παθών να μεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Εάν χρειασθεί, ζητήστε ιατρική βοήθεια. **Αντίδοτο:** Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Διηθητηρίων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΒΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΦΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Το κενό δοχείο σκευασμάς ξεπλένεται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενες με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανακίνηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Διατηρείται στην αρχική του απορροβήσιμη σκευασία, σε ξηρό, όμοιο και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της σκευασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 10 ΛΙΤΡΑ



Kayak[®] EC

Paraffinic mineral oil (Παραφινικό ορυκτέλαιο) 98,8%
Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο

Εγγυημένη σύνθεση: **Paraffinic mineral oil** 98,8% β/β
(μη θειωνούμενο υπόλειμμα 93% min)
Βοηθητικές ουσίες: 1,2% β/β
Ειδικό βάρος: 0,86 g/ml
Αρ.Έγκρ.Κυκλορ.: 14078/19.01.2005

**Θερμινός ποττός κατά
κοκκοειδών,
ακάρεων, αφίδων και
λεπιδοπτέρων**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

Παρασκευαστής-Τυποποιητής-Συσκευαστής-Διανομέας:
ΑΦ:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάννα

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΚΑΠΑΚ: Θερμινός ποττός κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτέρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκαστικό καλήφως φυλλώματος με ψεκαστικό κοινό (5-6 atm) ή μηχανοκίνητου (25-30 atm) και μικρό τύλιμο σκεύος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιομορφο γαλακτώμα και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτά γίνονται αφού πρώτα το γαλακτώμα του ορυκτέλαιου αναδεύεται καλά. Σε περίπτωση που το αναμεζεύουμε με βρέξιμο σκόνι, ετοιμάζουμε πρώτα το αραιώσιμο γαλακτώμα ορυκτέλαιου και μετά προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνι.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ-ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ: Χειμερινό αγρό του τετρανύου. Δόση: 1000 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Εφαρμόζεται τέσσερις χρονιά με αρχές άνοιξης, τουλάχιστον 10 ημέρες μετά το κλάδεμα και πριν την έναρξη διόγκωσης των οφθαλμών. **ΕΞΕΤΡΑΙΣΙΔΗ (Γάριον φρούτ-Λεμόνι-Μαντζουράνι-Ποτακάνη-Φοφιά):** Κόκκινα, Ψευδο-κοκκία, Λεμόνι, Άσπρη ψάρα, Μαύρη ψάρα, Άλλα κοκκιοειδή, Τετράνυοι, Αλευρόδεσ, **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά-Αχλαδιά):** Ψάρα Σαν-Ζοζέ, Παρτίτριο, Βαμπακόδα, Μυτιλομορφή ψάρα, Στακτιά ψάρα, Φυλλοδέστες, Τετρανύοι, Ψύλλια, Αφίδες, **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερυκοκό-Κερσιά-Ροδόκινι-Νεκταρίνι-Δαυσκινιά-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ:** Ψάρα Σαν-Ζοζέ, Βαμπακόδα, Εσπιοκοκκίον, Παρτίτριο, Μυτιλομορφή ψάρα, Αφίδες, Φυλλοδέστες, Ακάρεα, Προσφύες αφίδων και άλλων εντόμων. **ΕΛΙΑ:** Λεμόνι, Ασημένιος, Παρτίτριο, Ποτήνια, Μυτιλομορφή ψάρα, Βαμπακόδα, Προσφύες εντόμων. **ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:** Κοκκιοειδή, Φυλλοδέστες, Φυλλοδέστες, Αφίδες. Δόση: 1000-1500 κ.εκ./100 λίτρα νερό ή 500 κ.εκ./100 λίτρα νερό σε συνδυασμό με την συγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστάται ψεκασμοί: α) Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης), β) Καλοκαιριού, γ) Φθινοπώρου, δ) Χειμώνα. Για τα εσπιοκοκκίον, η καλύτερη εποχή είναι αρχές Ιουλίου με τέλος Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση έντονης προσβολής, μπορεί να γίνει ψεκασμός και το χειμώνα (Φεβρουάριο-Μάρτιο).

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Αμπέλι, Ακτινίδια (50), Εσπιοκοκκίον (200-400), Μηλοειδή-Πυρηνόκαρπα (150-250), Αμυγδαλιά (100-200), Ελιά (150-300), Καλλιμαστικό (80). **Αριθμός εφαρμογών/καλιεργητικό περίοδο:** Αμπέλι, Ακτινίδια: (1), Εσπιοκοκκίον-Μηλοειδή-Πυρηνόκαρπα-Αμυγδαλιά-Ελιά-Καλλιμαστικό: (4).

Παρατηρήσεις: 1) Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής. 2) Κατά τη χρήση του KAYAK EC τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Παύσιμα μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό. 3) Αποφεύγετε τον ψεκασμό στα αυτά είναι μισοαποξηραμένα και σε περιόδους έντονης ζέσθρας. 4) Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύος, όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανισθούν προβλήματα φυτοτοξικότητας. 5) Να μη γίνονται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού, καθώς και σε περιόδους ζέσθρας και υπερβολικής υγρασίας. 6) Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύος επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή ή έλπιε της εσπιοκοκκίου. 7) Στο μηλοειδή και ειδικά στο Κροσινό, να μην προηγείται η έλπιε εφαρμογή Captan, Folpet, Διπροντοξάνης, Carbaryl, σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας. 8) Να μη χρησιμοποιείται μαζί με Carbaryl στα σποροφόρα δένδρα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι-Ακτινίδια: **ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΖΙΜΟ** (εφαρμογή στο στάδιο του πηλόβουλου).

Λοιπές καλλιέργειες: **21 ημέρες**

Σε περίπτωση αναμενόμενης με άλλο σκεύος, οξείζουμε να τηρούμε την τελευταία επέμβαση του άλλου σκευάσματος (αν αυτή είναι πάνω από 20 ημέρες).

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύος είναι ένα φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, ελλείψει των προηγουμένων ή/και της. Να χρησιμοποιούνται οι μικρές δόσεις σε ενοχλητικό στο λήδι φυτώ (ή) σε μικρά καλλιμαστικά. Να γίνεται δοκιμή σε 1 ή 2 φυτά.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύος συνδυάζεται με όλα τα γνωστά εντομοκτόνα, δεικνύοντας και μυκητοκτόνα. δε συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, βερβεστίνο, βέλο, Propargite, Captan, Dinocap.

Μέρος του

