

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. • Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια. • Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών /προσώπου. • Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. • Πλύνετε τα ρούχα της δουλειάς μετά τον ψεκασμό. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάθαρτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να μην προκληθεί εμετός. Να γίνει πλύση στομάχου με 4 λίτρα νερού και μετά να χορηγηθεί ζωικός άνθρακας και θειικό νάτριο. Περαιτέρω συμπτωματική θεραπεία:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Επικοινωνήστε με γιατρό αν χρειαστεί.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και επικοινωνήστε με γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες
δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο
περιβάλλον

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν
κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα υλικά.
Αποφύγετε την απόρριψη του προϊόντος στο
περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές
οδηγίες / δεξιότητες δοσμένων ασφαλείας
Μην μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη
συσκευασία του. Αποφύγετε τη διασπορά
ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες
επιφάνειες.

Να μη χρησιμοποιείται σε περιοχές που μπορεί
να μολύνει επιφανειακά ή υπόγεια χερσαία
υδάτα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη
ψεκασμένη περιοχή για 7 τουλάχιστον ημέρες

Ημερ. Παραγωγής:

Ημερ. Λήξης:

Αριθμός Παρτίδας:

Βλέπε στο άνω μέρος της φιάλης



Επικίνδυνο
για το περιβάλλον



KENDO 5.34SC

fenpyroximate (φενπιροξιμέιτ) 5,34%

Συμπυκνωμένο αιώρημα

Εγγυημένη σύνθεση: fenpyroximate 5,34% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 94,53% β/β

**Μη διασυστηματικό ακαρεοκτόνο
που δρά δια επαφής και από στομάχου
σε όλα τα στάδια των ακάρεων**

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ
Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς**

Αριθμ.Εγκρ. Κυκλοφορίας: 2063/ 23-7-1993

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΣ: NIKON NOHYAKU Co, Ιαπωνία
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

Κ.Λ. Ευθυμιόπουλος οβ.ε.ε

ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• ΤΗΛ.2310 568656 • FAX:2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Μηλίς: Κόκκινος τετράνυχος (*Panonychus ulmi*)

Εσπεριδοειδή: Τετράνυχος εσπεριδοειδών (*Panonychus citri*)

ΔΟΣΗ: 75- 100 κ.εκ./100 λίτρα νερού.

Παρατηρήσεις:

1) Η χαμηλή δόση χρησιμοποιείται όταν: α) η εκκόλαψη των αυγών έχει συντελεστεί τουλάχιστον κατά 80%, β) ο πληθυσμός δεν υπερβαίνει τις 20 κινητές μορφές ανά φύλλο.

2) Η μεγάλη δόση χρησιμοποιείται όταν: τα αυγά που έχουν εκκολληθεί είναι πολύ λίγα ή οι κινητές μορφές/φύλλα είναι πάνω από 20 άτομα.

Περιορισμοί κατά τη χρήση:

Να μη χρησιμοποιούνται κατά την ίδια καλλιεργητική περίοδο δυο ή περισσότερα από τα σκευάσματα KENDO SC, MASAI 20 WP, PRIDE 20 SC και NEXTER 20 EC για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των ακάρεων.

Να μην εφαρμόζεται περισσότερο από μια (1) φορά σε κάθε καλλιεργητική περίοδο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Να μη συνδυάζεται με βορδιγάλιο ποττό και γενικά χαλκούχα σκευάσματα και με θειασβεστίο. Σε περίπτωση συνδυασμού του με άλλα σκευάσματα να προηγείται πάντα δοκιμή σε μικρή κλίμακα. Δε συνιστάται η ανάμιξη του με περισσότερα του ενός σκευάσματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα KENDO ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας το ανακάτεμα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Μηλίς: 7 ημέρες

Εσπεριδοειδή: 14 ημέρες

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση των κενών μέσω συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυντος τα ρίχνουμε το ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από την υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 και 30°C, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια.