

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
- Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής.
 - Στα λαχανικά ν' αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.
 - Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
 - Στις καλλιέργειες αμπελι, εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ψεκασμός καλύψεως.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

- Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση.
- Ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας συνέχεια.
- Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

- Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες αμπελιού DELAWARE, ROSETTE, NIAGARA και CONCORD.
- Είναι φυτοτοξικό στη Ροδακινιά και Νεκταρινιά μετά την έκπτυξη των φύλλων.
- Επαναλαμβανόμενες χρήσεις στα μηλοειδή μπορεί να προκαλέσουν καστανό αποχρωματισμό.
- Εφαρμογή στις κίτρινες ποικιλίες της Μηλιάς μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό. Στη μηλιά οι εφαρμογές να σταματούν όταν η πράσινη κορυφή είναι μήκος 1 εκ.
- Ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας αυξάνεται στη χαμηλές θερμοκρασίες (<5°C) και σε υγρασία.
- Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.
- Στις ευαίσθητες ποικιλίες αμυγδαλιάς όπως η Peerless & Mission παρατηρείται ελαφρά φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται μετά την άνθηση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με όξινα σκευάσματα και αλκαλικούς ποτίστους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

- ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: 21 ημέρες, ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Καρυδιά): 28 ημέρες
- ΜΗΛΟΕΙΔΗ, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Μη εφαρμοδισμό (καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή)
- ΑΜΠΕΛΙ (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): 21 ημέρες
- ΕΛΙΑ: 21 ημέρες
- ΛΑΧΑΝΙΚΑ (υπαίθρου & θερμοκηπίου): 7 ημέρες
- ΤΟΜΑΤΑ (υπαίθρου): 10 ημέρες
- ΤΟΜΑΤΑ (θερμοκηπίου): 7 ημέρες
- ΠΑΤΑΤΑ, ΑΡΑΧΙΔΑ, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: 21 ημέρες

- ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**
- Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
 - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 - Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε .
 - Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
 - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
 - Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
 - Πλύντε τα ρούχα της δουλειάς μετά τον ψεκασμό.
 - Πλύντε τα χέρια και τα αδέλμητα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
 - Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
 - Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
 - Αποφύγετε την εξευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:** Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για ήλψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.
- Αντίδοτο:** Πενικιλιδιμίνη.
- Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777**

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:
Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες), μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίασμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε όλη τα σημεία συλλογής, για ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:
Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε μέρος ξηρό, όροσερό (θερμοκρασία κάτω από 38° C) και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Ημερομηνία παραγωγής: Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας
Αριθμός παρτίδας:



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ-ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ

ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
N



Επικίνδυνο για
το περιβάλλον

• Επιβλαβές όταν
εισπνέεται και σε
περίπτωση κατάποσης.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες
δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο
περιβάλλον.
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκευάσμα ή τη
συσκευασία του.
Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την
ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

Καθαρό βάρος: 3 κιλά

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

Κ.Θ. Ευθυμιάδη ΟΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Σίνδος - 570 22 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 568656 Fax: 2310 798423 e-mail: info@efthymiadis.gr

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιφ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά): Για Κορυφοξηφρά (*Phoma tracheiphila*), Ανθράκνωση (*Colletotrichum gloeosporioides*), Σεπτορίωση (*Septoria spp.*) μ'εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου και για Προσβολή κησαδόκων, φύλλων και καρπών (*Pseudomonas syringae*) μ'εφαρμογές πριν την έναρξη των βροχών και μετά από χαλάζι ή παγετό. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 75-130 γρ./100 λ. νερό (150-325γρ.σ.κ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-250 λίτρα/στρ.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ
Αμυγδαλιά: Για Κορύνεο (*Stigmina carpophila*) μ'εφαρμογές στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και το χειμώνα πριν την έκπτυξη των ξυλοφόρων οφθαλμών. Για Εξέλιωση κορυού και κηδών (*Pseudomonas amygdali*) μ'εφαρμογές εάν υπάρχουν ευνοϊκές για το βακτήριο συνθήκες συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής στην αρχή της άνθησης. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 185-225 γρ./100 λ. νερό (185-340 γρ.σ.κ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρ.

Καρυδιά: Για Ανθράκνωση (*Marsonina juglandis*) οι εφαρμογες αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 μέρες. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 155-225 γρ./100 λ. νερό (155-340 γρ.σ.κ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρ.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ
Μηλιά, Αχλαδιά: Για Φουζικηλάδιο (*Venturia inaequalis*, *V.Pirina*), Σεπτορίωση (*Septoria spp.*) και Φαϊά οήλη (*Sclerotinia laxa*) μ'εφαρμογές το φθινόπωρο, πριν την πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πράσινης κορυφής. Για Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae*) και Βακτηριακό κήψιμο (*Erwinia amylovora*) στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες συνιστώνται δύο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 155-340 γρ./100 λ. νερό (155-680 γρ.σ.κ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα/στρ..

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
Βερικοκιά: Για Κορύνεο (*Stigmina carpophila*) μ'εφαρμογές στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, α) το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών και για Φαϊά οήλη (*Sclerotinia laxa*) μ'εφαρμογές κατά τη διόγκωση των οφθαλμών και στη ρόδιση κορυφή. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 185-235 γρ./100 λ. νερό (185-280 γρ.σ.κ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα/στρ.

Κερασιά: Για Κορύνεο (*Stigmina carpophila*) και Προσβολή από *Pseudomonas syringae* μ'εφαρμογές στις περιοχές όπου οι ασθένειες ενδημούν το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 185-240 γρ./100 λ. νερό (185-285 γρ.σ.κ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα/στρ.

Ροδακινιά, Νεκταρινιά: Για Κορύνεο (*Stigmina carpophila*), Εξώσασκο (*Taphrina deformans*) και Κησαδοσπορίωση (*Cladosporium carpophilum*) μ'εφαρμογές στις περιοχές όπου οι ασθένειες ενδημούν, το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών, για Φαϊά οήλη (*Sclerotinia laxa*) μ'εφαρμογές κατά τη διόγκωση των οφθαλμών και στη ρόδιση κορυφή και για Βακτηριακό έλκος (*Pseudomonas spp.*) μ'εφαρμογές σε περιοχές που ενδημεί η ασθένεια στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 155-240 γρ./100 λ. νερό (155-285 γρ.σ.κ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα/στρ.

ΑΜΠΕΛΙ (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): Για Περονόσπορο (*Plasmopara viticola*), Ανθράκωση (*Elsinoe ampelina*) και Βακτηριακή νέκρωση (*Xanthomonas ampelina*) μ'εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ., μετά από 10 μέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά την γονιμοποίηση. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 125-310 γρ./100 λ. νερό (155-185 γρ.σ.κ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα/στρ.

ΕΛΙΑ: Για Κυκλοκόνιο (*Cycloconium oleaginum*) μ'εφαρμογές στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια από αρχές φθινοπώρου μέχρι αρχές άνοιξης. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 340 γρ./100 λ. νερό (510-1020 γρ.σ.κ./στρ.) (φθινόπωρο), 150 γρ./100 λ. νερό (225-450 γρ.σ.κ./στρ.) (άνοιξη). Για Γλοιοσπόριο (*Gaeosporium olivarium*) με δύο εφαρμογές: Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 μέρες αργότερα. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 340 γρ./100 λ. νερό (510-1020 γρ.σ.κ./στρ.) και για Καρκίνωση (*Pseudomonas savastanoi*) μ'εφαρμογές μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 340 γρ./100 λ. νερό (510-1020 γρ.σ.κ./στρ.) (φθινόπωρο), 150 γρ./100 λ. νερό (225-450 γρ.σ.κ./στρ.) (άνοιξη). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-300 λίτρα/στρ.

ΤΟΜΑΤΑ (υπαίθρου-θερμοκηπίου) - **ΠΕΠΕΡΙΑ** (υπαίθρου-θερμοκηπίου): Για Περονόσπορο (*Phytophthora infestans*) (*Peronospora tabacina*) μ'εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων και επανάληψη ανά 10-14 μέρες, για Κησαδοσπορίωση (*Cladosporium fulvum*), Σεπτορίωση (*Septoria lycopersici*), και Ανθράκνωση (*Colletotrichum spp.*) μ'εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 10-14 μέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής και για Βακτηρίωσης (*Pseudomonas spp.*, *Xanthomonas vesicatoria*) μ'εφαρμογές στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων μέχρι την καρπώδεση. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 185-360 γρ./100 λ. νερό (185-225 γρ.σ.κ./στρ.) για βαριά προσβολή, 100-230 γρ./100 λ. νερό (100-155 γρ.σ.κ./στρ.) για ελαφρά προσβολή. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (υπαίθρου-θερμοκηπίου) - **Αγγούρι, κολλόκυθι, πεπόνι, καρπούζι:** Για Περονόσπορο (*Pseudoperonospora cubensis*), Ανθράκνωση (*Colletotrichum lagenarium*), Κησαδοσπορίωση, (*Cladosporium cucumerinum*) και Βακτηρία (*Erwinia tracheiphila*) μ'εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 10-14 μέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 155 γρ./100 λ. νερό (100-155 γρ.σ.κ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.

ΦΑΣΟΛΙ: Για Σεπτορίωση (*Septoria apil*) και Κερκοσπορίωση (*Cercospora apil*) μ'εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επανάληψη ανά 7-10 μέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 200 γρ./100 λ. νερό (100-155 γρ.σ.κ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ.

ΑΡΑΧΙΔΑ: Για Κερκοσπορίωση (*Cercospora spp.*) μ'εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 7-10 μέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 260 γρ./100 λ. νερό (155 γρ.σ.κ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60 λίτρα/στρ.

ΠΑΤΑΤΑ: Για Περονόσπορο (*Phytophthora infestans*) και Ανθράκνωση (*Colletotrichum atramentarium*) μ'εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επανάληψη ανά 10-14 μέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 255 γρ./100 λ. νερό (185-255 γρ.σ.κ./στρ.) για βαριά προσβολή, 155 γρ./100 λ. νερό (100-155 γρ.σ.κ./στρ.) για ελαφρά προσβολή. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Για Κερκοσπορίωση (*Cercospora beticola*) μ'εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 10-14 μέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 390 γρ./100 λ. νερό (155 γρ.σ.κ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 λίτρα/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερπητική περίοδο:

Γκρέιφ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Αμυγδαλιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Φασόλι, Σέλινο, Αραχίδα: 3
Καρυδιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Αμπελί, Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολλόκυθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Πατάτα, Ζαχαρότευτλα: 4
Ελιά: 2