

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του αυτήν την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Θεραπεία συμπτωματική.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΑΤΑ

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΝΤΟΜΑ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ Ή ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ.

• Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα, όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας.

• Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνηθης.

• Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίττωμα (π.χ. περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο).

ΒΛΑΒΕΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του απορροβιστική συσκευασία, καλά κλειστά, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, χωρίς να εκτίθεται απ' ευθείας στο φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



04/2011-10

Kohinor®

200SL

Imidacloprid (Ιμιντακλιοπρίντ) 20%
Υγρό διάλυμα

Εγγυστημένη σύνθεση: **Imidacloprid** 20% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 82,37% β/β
Αρ. Έγκρ. Κυκλ. φ.: 14200/10.09.2007

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η χρήση του σε περιοχές που έχουν άμεση γειτνίαση με επίγεια ή υπόγεια ύδατα. Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:

Μαγνα Γεωργικές Εισροές ΕΠΕ.

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2112205598

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2112205555, Φαξ: 2112205559

Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΚΟΧΙΝΟΡ: Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως ή ριζοποτίσματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Δεν χρειάζεται προδιάλυση. Ρίχνουμε το σκεύασμα κατευθείαν στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΠΙΠΕΡΙΔΟΙΔΗ (Γρήιφ φρούτ-Λεμονιά-Μανταρινιά-Πορτοκαλιά): Εριώδης αθευρώδης. Δόση: 75 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ψεκασμός φυλλώματος. Με την εμφάνιση των νυμφών του εντόμου (στάδιο L1 και L2). Φυλλοκλιάντης. Δόση: 50-75 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. **ΑΧΛΙΑΔΙΑ:** Ψύλλοι αχλιάδης. Δόση: 60 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ψεκασμός με την έναρξη της προσβολής. Μπορεί να εφαρμοστεί στις εξής περιόδους: Προσθνικά μέχρι το στάδιο έναρξης της θεικής κορυφής (BBCH: 54) και μετά την καρποδίαση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79). **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ:** Αφίδες. Δόση: 25-30 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ψεκασμός με την έναρξη της προσβολής. Μπορεί να εφαρμοστεί στις εξής περιόδους: Προσθνικά μέχρι το στάδιο έναρξης της ρόδινης κορυφής (BBCH: 54) και μετά την καρποδίαση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79). **ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:** Αφίδες, Αθευρώδης. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. **ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΛΗΠΙΟΥ:** Αθευρώδης. Δόση: 0,05 κ.εκ./φυτό ή 75-125 κ.εκ./στρ.¹). Ριζοπότισμα με το νερό της άρδευσης, με την έναρξη της προσβολής. **ΑΙΤΟΥΡΙ (Θερμοκλήπιου & Υπαίθρου):** Αθευρώδης. Δόση: 0,05 κ.εκ./φυτό ή 75-125 κ.εκ./στρ.¹). Ριζοπότισμα με το νερό της άρδευσης, με την έναρξη της προσβολής. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Αφίδες. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. **ΠΑΤΑΤΑ:** Αφίδες, Δορυφόρος. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την έναρξη της προσβολής και μέχρι 4 αφίδες ανά φύλλο. Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει μελίττωμα. **ΚΑΠΝΟΣ:** Αφίδες. α) Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. Δόση: 25-60 κ.εκ./100 λίτρα νερό (Μέγιστη δόση: 30 κ.εκ./στρ.). β) Ριζοπότισμα με το νερό της άρδευσης, με την έναρξη της προσβολής. Δόση: 50-100 κ.εκ./στρ.¹). ^(*) το εύρος της δόσης εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): Επεριδοειδή (200-400), Αχλιάδι (150), Ροδακινιά (150-250), Τομάτα υπαίθρου-Πατάτα-Καπνός (50-100), Βαμβάκι (50-80).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιαστήματα επεμβάσεων: Επεριδοειδή-Καπνός: 2 (ανά 20-30 ημέρες), Αχλιάδι: 1, Ροδακινιά: 2 (ανά 28 ημέρες), Τομάτα-Αγγούρι-Βαμβάκι-Πατάτα: 2 (ανά 14 ημέρες).

Παρατηρήσεις: α) Στα επεριδοειδή, σε προγράμματα «ορθοκληρωμένες αντιμετώπισης», συνιστάται να εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου Cales rosae ωρίμων για ωτοκία. β) Στα επεριδοειδή, σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός, παρούσα μελίττωμα), ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο. γ) Στα επεριδοειδή, για την καταπολέμηση του Φυλλοκλιάντη (Phylloxera citrella), η μικρή δόση συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής, ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αχλιάδι-Καπνός-Τομάτα-Αγγούρι: 7 ημέρες. Επεριδοειδή: 21 ημέρες. Βαμβάκι: 28 ημέρες. Ροδακινιά-Πατάτα: 14 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.