

LATEK

36SL

Εγγυημένη σύνθεση: Glyphosate οξύ 36% β/ο
[σε μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 48,6%β/ο]
Βοηθητικές ουσίες 56,7% β/β

GLYPHOSATE (ΓΚΛΥΦΟΖΕΙΤ) οξύ 36%

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφ.: 7991 /21.09.12

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού.

XI



Ερεθίζει τα μάτια
Μπορεί να προκαλέσει
ευαισθητοποίηση
σε επαφή με το δέρμα

Τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς,
μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

N



ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

**Περιεχόμενο:
10 ΛΙΤΡΑ**



Κάτοχος της έγκρισης-
Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά :



κελλαφάρμ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τσχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: -Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. -Όταν τα χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. -Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. -Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. -Φοράτε κατάλληλες μπότες. -Οι εργατές θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης
Πρώτες βοήθειες - Αντιδοτό: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Χρησιμοποιήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μη χρησιμοποιήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση εμετού: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Η χρήση στροπίνης και οξίμης δεν ενδείκνυται.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210.77.93.777

Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αέραστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αέραστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τυλιγμένο όταν αποθηκεύεται, στην αρχική οργανωμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Αρ. Παρτίδας, Ημερ. Παρασκευής, Ημ. Λήξης: Βλέπετε ένα μέρος φυλλοδ.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ : Σε Επεριεχόμενα (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ-φρουτ, Κίτρινα), **Ακρόδρυα** (Αμυγδαλιά), **Μηλοειδή** (Μηλιά, Αχλαδιά), **Πυρηνόκαρπα** (Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Ροδάκινά, Κερσιά), **Αμπέλια** (επιτραπέζια και ανοικοποίηση), **Ελιές** καταπολέμα: α) Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) (*) με δόση 150-200 κ.εκ. / στρέμμα. Ειδικά για Μολόγα (*Malva spp.*), Τσουκνίδα (*Urtica spp.*), Πολυκόμμη (*Polygonum sp.*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*) η δόση είναι 400-600 κ.εκ. / στρέμμα. Εως 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης. β) Πολυετή ζιζάνια (**): 500-1000 κ.εκ. / στρέμμα (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου) Αγριάδα (*Cynodon dactylon*) με δόση 750-1000 κ.εκ. / στρέμμα, Βελιουρά (*Sorghum halepense*) με δόση 500 κ.εκ. / στρέμμα, Φιτέρη (*Pteridium aquilinum*) με δόση 500 κ.εκ. / στρέμμα, Περικοκιάδα (*Convolvulus anensis*) με δόση 1000 κ.εκ. / στρέμμα, Κίρσο (*Cirsium arvense*) με δόση 1000 κ.εκ. / στρέμμα. Για τα ανωτέρω ζιζάνια μια εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην ανθήση ή λίγο μετά από αυτή. Κίτρηρη (*Cyperus spp.*): Δύο εφαρμογές: 1η εφαρμογή κατά την ανθήση με δόση 500 κ.εκ. / στρέμμα και η 2η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης με δόση 500 κ.εκ. / στρέμμα. **Στους Αγρούς μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για απορ. καταπολέμα:** α) Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) (*) και β) Πολυετή ζιζάνια (**): βλέπε οδηγίες ανωτέρω. Σε **σκαλιεργίες** εκτάσεις καταπολέμα: α) Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) (*) και β) Πολυετή ζιζάνια (**): βλέπε οδηγίες ανωτέρω γ) Ξυλωδείς θάμνοι, δέντρα, βάτα (*Rubus spp.*) κ.λπ. Μια εφαρμογή στη πλήρη ανάπτυξη. Στο **Βαμβάκι** καταπολέμα: Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) (1) με δόση 150-200 κ.εκ. / στρέμμα και το Βελιουρά (*Sorghum halepense*) με δόση 500 κ.εκ. / στρέμμα. Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της ανθήσης (1 εφαρμογή). Στο βαμβάκι ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της ανθήσης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών. Στον **καπνό** καταπολέμα την Οροβάχη (*Orobanche patens*): Δύο ψεκασμοί καλύψεως: α) 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση με δόση 40 κ.εκ. / στρέμμα και β) 60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση με δόση 60 κ.εκ. / στρέμμα. **Κατά μήκος ορόσειμων και στραγγιστικών καναλιών:** καταπολέμα υδροχαρά ζιζάνια. Ένας ψεκασμός κοντά ή κατά την ανθήση των ζιζανίων με δόση 800-1000 κ.εκ. / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** Για όλες τις χρήσεις εκτός του καπνού 20-40 λίτρα/στρ. Μόνο στον καπνό χρησιμοποιούνται 30-40 λίτρα/στρ. (*) Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνθήκες μία με δύο εφαρμογές (χρυσάνο- ανοήνη) ή και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης. (**) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνθήκη μία εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην ανθήση κατά την ανθήση ή λίγο μετά από αυτή. **Παρατηρήσεις:** 1. Στις δενδροειδείς καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραρτήματα και μη επωλόμενες πηγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους σπαρμένους ή αμπελώνες από το τρίτο (3ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Malva spp.* (μολόγες), *Urtica spp.* (τσουκνίδες), *Polygonum spp.* (πολυκόμμη), *Portulaca oleracea* (αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 400-600 κυβ.εκ. /στρέμμα, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους. 3. Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15 – 30 εκατοστά. 4. Για την στέφη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεπλάκωμα της κορυφής. 5. Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. 6. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για απογορραγωγή. 7. Μην ψεκάσετε όταν φυσάει. 8. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους. 9. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. 10. Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια. 11. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από τα μπέκ για την αποφυγή φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες.

Τρόπος δράσης: Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων. **Τρόπος εφαρμογής:** Ομοιομορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγή φυτοτοξικότητας ή σκωρύνσεων υπολειμμάτων στους καρπούς. Για την αροβάχη στον καπνό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό καλύψεως της φυτείας. Χρησιμοποιείται μικρό τύπος σκαλίστας και ψεκάει με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI). **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε ακαθάρτο σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου. **Συνδυαστικότητα:** -- Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. **Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογικής ή περιβαλλοντολογικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να απολκεστεί:** - Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιέργεια ή περιβαντολογικές μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην δράση της ουσίας glyphosate. - Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων προς την άκρη και με τρόπο ώστε σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην πέσουν στο νερό. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και απορ. ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Σε αγρούς μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για απορ. να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατέσσερις (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης των ανθρώπων ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του. **Οδηγίες για την ασφαλή αποσπορά του προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστίνονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Τελευταία επεξεργασία πριν τη συγκομιδή:** Επεριεχόμενα (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ-φρουτ, Κίτρινα), Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Ροδάκινά, Κερσιά), Αμπέλια (επιτραπέζια και ανοικοποίηση), Ελιές, Βαμβάκι, Καπνός: 7 ημέρες