

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
- Φοράτε κατάλληλες μπότες.
- Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.
- Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μην χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, διαπνεύστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Η χρήση ατρώπων και οξέων δεν ενδείκνυται.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

**ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη.

Ειδικές Προφυλάξεις:

- Να εφαρμόζονται ενλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην δραστική ουσία glyphosate.
- Σε αρδευτικά και στραγγιακά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα πρανή και με τρόπο ώστε σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην πάνε στο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλυσμα (τα νερά του ξεπλυσματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩ ΣΥΣΤΕΛΜΑΤΟΣ:

ΣΥΝΘΕΚΣ ΑΠΟΔΕΚΕΥΣΗΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:**



LEONE

36 SL

ΛΕΟΝΕ

Ζιζανιοκτόνο

Πυκνό διάλυμα (SL)

Glyphosate - Γλυφοσέιτ 36%

Εγγυημένη σύνθεση Glyphosate οξύ: 36% β/ο
υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης: 48,6% β/ο
Βοηθ. ουσίες: 57% β/β



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

• Κινδύνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 7492 / 21.6.1996

Κάτοχος της έγκρισης – Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γληνού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com | www.ypsilon-agro.com

Τυποποίησης: Monsanto Europe SA, Βέλγιο.

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

- **Επεριδεδισή:** Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ-φρουτ, Κιτριά
- **Ακρόδρυς:** Αμυγδαλιά
- **Μηλοειδή:** Μηλιά, Αγγυαλιά
- **Πυρηνόκαρπα:** Βερυκοκιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά, Κερασιά
- **Αμύγδα** (επιτραπέζια και οινολογική)
- **Ελιές**

Για Ετήσια ζιζάνια (*): (Αγρωστώδη και πλατύφυλλα) 150-200 κ.εκ./στρ. Μολόχα (*Malva sp.*), Τσουκνίδα (*Urtica sp.*), Πολυκόμπος (*Polygonum sp.*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*) 400-600 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ωριμότητας τους ανάπτυξης.

Για Πολυετή ζιζάνια ():** Αγριάδα (*Cynodon dactylon*) 750-1000 κ.εκ./στρ. Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Φτέρη (*Pteridium aquilinum*) 500 κ.εκ./στρ. Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*), Κίρσο (*Cirsium arvense*) 1000 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. Κύπρη (*Cyperus sp.*) α) τη εφαρμογή κατά την άνθηση 600 κ.εκ./στρ. β) τη εφαρμογή σε περίπτωση αναδόμησης 500 κ.εκ./στρ.

• **Βαμβάκι (***)**: Για Ετήσια ζιζάνια (*) (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) 150-200 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης. Για Πολυετή ζιζάνια (*Sorghum halepense*) 500 κ.εκ./στρ.

• **Καπνός:** Οροβάγχη (*Orobancha ramosa*) Ψεκασμό καλύψεως: α) 40 κ.εκ./στρ. 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση β) 60 κ.εκ./στρ. 60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

• **Αγρό μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά:**

Για Ετήσια ζιζάνια (*): (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) 150-200 κ.εκ./στρ. Μολόχα (*Malva sp.*), Τσουκνίδα (*Urtica sp.*), Πολυκόμπος (*Polygonum sp.*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*) 400-600 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ωριμότητας τους ανάπτυξης. **Για Πολυετή ζιζάνια (**)** 500-1000 (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω). Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.

• **Ακαλλιεργήτες εκτάσεις: Ετήσια ζιζάνια (*)** (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) 150-200 κ.εκ./στρ. Μολόχα (*Malva sp.*), Τσουκνίδα (*Urtica sp.*), Πολυκόμπος (*Polygonum sp.*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*) 400-600 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ωριμότητας τους ανάπτυξης. **Πολυετή ζιζάνια (**)** 500-1000 κ.εκ./στρ. (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω). Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. Για ξυλωδείς θάμνους, βότα (*Rubus sp.*) 500-1000 κ.εκ./στρ. Όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη.

• **Κατά μήκος ορδοτικών και στραγγιακών καναλιών:** Για Υδροχαρή ζιζάνια 800-1000 κ.εκ./στρ. Κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων.

ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Για όλα τα ζιζάνια 20-40 λίτρα/στρ. Για την Οροβάγχη στον καπνό 30-40 λίτρα/στρ.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

• **Επεριδεδισή, Ακρόδρυς, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμύγδα, Ελιές, Ακαλλιεργήτες εκτάσεις:** Για τα ετήσια ζιζάνια: 2 Για τα πολυετή ζιζάνια: 1 (2 εφαρμογές για την κύπρη)

• **Βαμβάκι, Αγρό μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά:** 1

• **Καπνός:** 2

• **Για υδροχαρή ζιζάνια:** 1

• **Για ξυλωδείς θάμνους, βότα:** 1

(*) Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνθήκες μία με δύο εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ωριμότητας τους ανάπτυξης. (**) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτούνται συνθήκες μία εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. (***) Στο βαμβάκι ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών. Προτείνεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από τα μπεκ.

Παρατηρήσεις:

1. Στις δασοκαλλιέργειες και στα αμπελίσια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλα, τρυφερούς βλαστούς, παραρτήρες και μη επουλωμένους πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους απορροές ή αμπελώνες από το τρίτο (3^{ος}) έτος από την φύτευση τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Malva sp.* (μολόχα), *Urtica sp.* (τσουκνίδα), *Polygonum sp.* (πολυκόμπος), *Portulaca oleracea* (αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 400-600 κυβ. εκ./στρέμμα, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους.
3. Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκατοστά
4. Για την φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής
5. Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.
6. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για απορροαγωγή.
7. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
8. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους.
9. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
10. Σε αγρούς μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκαεπταόμιον (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.
11. Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομαλόμορφος ψεκασμός των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγή τυχόν συσσωρεύσεων φυτοεκδημάτων στους καρπούς.

Για την οροβάγχη στον καπνό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό καλύψεως της φύτευσης. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάζετε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε ακαθάρτο ή ακαθόριστο νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυθίο. Ξεπλύνετε το βυθίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Όλες οι καλλιέργειες: 7 ημέρες

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.