

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. •Αποφεύγετε την έκθεση. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. •Φοράτε κατάλληλης μπότες. •Οι εργάτες πρέπει να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία και μπότες, εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). **Αντιδοτο:** Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Για τη αποφυγή ανεπιθύμητων ανεπιθύμητων •Εφαρμογή ενοχλητικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα, κ.λπ.), ώστε να μειωθούν ο αριθμός των εφαρμογών στις απαιτούμενες απαιτήσεις. •Εφαρμογή σε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης. •Σε μεταφυτευτικές εφαρμογές να αποφεύγεται ο ψεκασμός με ζεστό καιρό (κίνδυνος φυτοτοξικότητας). •Να μη χρησιμοποιείται σε αμυγδαλιές, αμύγδαλα, γιατί οι κίνδυνοι φυτοτοξικότητας είναι αυξημένοι, ούτε σε οργανικά έδαφη (καυκάδι, τυρφοδάρι) γιατί η αποστειρωτικότητα είναι μειωμένη.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε ευαίσθητες καλλιέργειες πριν περάσουν 4 μήνες από την εφαρμογή του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ:

Το κενό δοχείο συσκευασίας ξεπλένεται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο και μαζί με τα κομμάτια, που θα καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλο σε σημείο συλλήψης για διαχείριση σαν επικίνδυνα απόβλητα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



Linagan®

50SC

Linuron (Λινουρόν) 50%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα

Νέα Υγρή Μορφή

Εγγυημένη σύνθεση: **Linuron 50% β/ο**

Βοηθητικές ουσίες: 55,0% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Φ.: 7566/23.12.08 - Ημερομηνία Λήξης: 31.12.2013

**Προφυτρωτικό-Μεταφυτρωτικό Ζιζανιοκτόνο
για την καταπολέμηση μονοετών
ηλιατόφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΠΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1,2-BENZISOTHAZOL-3(2H)-ONE / ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ



ΤΟΞΙΚΟ

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τεχνική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2112205570, Φαξ: 2112205572

Θεσσ/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΛΙΝΑΓΚΑΝ: Προφυτρωτικό-μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση μονοετών ηλιατόφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. Δρα τόσο από το φύλλωμα όσο και από τις ρίζες των ζιζανίων. Η υπολειμματική του δράση στο έδαφος υπολογίζεται σε 3-6 μήνες, ανάλογα με τη δόση που χρησιμοποιήθηκε και τις συνθήκες του εδάφους και του κλίματος. Σε βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο φωσφορικό ή της φωσφορικής μονάδας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοιομορφος ψεκασμός σε υγνό έδαφος ή έδαφος που τα ζιζάνια είναι ακόμα μικρά, με 15-60 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείτε μικρό τύπου σκόπας και ψεκάζετε με πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμόσφαιρες (45 psi). Ο ψεκασμός να γίνεται υπό συνεχή ανάδευση του ψεκαστικού υγρού και με σταθερή ταχύτητα. Μετά την εφαρμογή του προϊόντος, απαιτείται βροχή ή πότισμα για την ενεργοποίηση του προϊόντος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε λίγο νερό. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ (κ.ε.κ./στρ.)-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΠΡΑΣΟ: Δόση: 100-140. Μεταφυτρωτικό: όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 3-5 φύλλων και τα ζιζάνια είναι μικρά (μέχρι 5 εκ.). **ΣΠΑΡΑΓΓΙ:** Δόση: 100-150. Προφυτρωτικό: α) είτε στην επιφάνεια των σμαριών, μετά την κατασκευή τους, πριν την κάλυψη με ηλιοκάλυψη, β) είτε στην επιφάνεια του ισοπεδωμένου εδάφους (μετά το τέλος της συγκομιδής και την καταστροφή των σμαριών), το αργότερο μέχρι τέλη Ιουλίου και πριν το στάδιο ΒΒCH 08. **ΑΓΚΙΝΑΡΑ:** Δόση: 90-140. Προφυτρωτικό: πριν το φύτεμα της καλλιέργειας και των ζιζανίων. **ΑΓΚΙΝΑΡΑ:** Δόση: 100-140. Προφυτρωτικό: αμέσως μετά τη σπορά. **ΠΑΤΑΤΑ:** Δόση: 150-190. α) Προφυτρωτικό: Μετά τη φύτευση και πριν φυτρώσει η καλλιέργεια και τα ζιζάνια, β) Μεταφυτρωτικό: Με κατευθυνόμενο ψεκασμό μεταξύ των γραμμών μετά τον παράκω των πατατοφύτων. **ΑΡΑΒΟΣΙΤΑ:** Δόση: 100-190. Προφυτρωτικό: Αμέσως μετά τη σπορά. **ΓΛΑΔΙΟΛΟΣ & ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΒΛΩΔΗ (Τουλίνα-Ιριδες-Νάρκισσοι-Σουμπουλιά):** Δόση: 150-190. Προφυτρωτικό: Μετά τη μεταφύτευση των βοτάνων και πριν φυτρώσει η καλλιέργεια και τα ζιζάνια.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): Πράσο (30-60), Σπαράγγι-Αγκινάρα (15-40), Ηλιανθος-Πατάτα-Αραβόσιτος (30-50), Γλαδιόλος & Φθινοπωρινά βλωδή (40-60). **Μείγματος αριθμός εφαρμογών/καλλιέργεια/περίοδο:** Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις: 1) Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα στο φύτεμα ή όταν είναι μικρά. 2) Οι μεγαλύτερες δόσεις για τα βαρέα έδαφη. 3) **Καταπολέμηση ζιζανίων:** Ανθεμίδια, Καφέλα, Λουβδόδια, Αγριομαργαρίτα, Κοινή παπαρούνα, Κοινή πόα, Λιπάρδα, Χαμομήλι, Μαρτάκια, Αγριο σιτάρι, Ζωάκος, Στεφάνηρα, Μικρή τσουκνίδα, Αγριομυρτιά, Αγριομαμακάκι, Αιματόχορτο, Αναγαλήθια, Αναρριχώμενο Πολύγονο, Αντράκλα, Ασπράγαθο, Βήλητα, Ήμερο σιτάρι, Λεπτή ηρα, Λιθοσπορίο, Μακρόκαρπη Παπαρούνα, Μουχρίτσας, Νεροπινερία, Ποιάνθη ήρα, Ραπανίδα, Σετόρια, Σπέρνογυλη, Αγριομαμάκι. 4) **Ανεπιθύμητα ζιζάνια:** Αγριόβικος (Vicia spp.), Αγριοβρώμη (Avena spp.), Αγριορόδι (Taraxacum spp.), Αλεπουράκι (Alopecurus myosuroides), Δωδεκάνθη (Lamium amplexicaule), Καπνόχορτο (Fumaria spp.), Μεγαλόκαρπη καλλιτσίδα (Galium aparine), Βερόνικα (Veronica spp.), Ποιάνθη (Polygonum aviculare), Ραυόγκυλος (Ranunculus spp.).

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Το Linagan® 50SC διατηρείται, χωρίς να ανοιχτεί, στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ήλιο και υγρασία. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ Ή ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ