

ΛΙΝΟΥΡΟΝ ΑΓΚΑΝ:
Διασυστηματικό προφυτρωτικό-μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων πηlatύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. Δρα κυρίως από τις ρίζες, αλλή και από το φύλλωμα των ζιζανίων. Στο βιοχημικό επίπεδο, η δράση του είναι στο φωτοσυστήμα II της φωτοσύνθεσης. Η υπολειμματική του δράση στο έδαφος υπολογίζεται σε 3-6 μήνες, ανάλογα με τη δόση που χρησιμοποιήθηκε και τις συνθήκες του εδάφους και του κλίματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ομοιόμορφος ψεκασμός σε γυμνό έδαφος ή σε έδαφος που τα ζιζάνια είναι ακόμα μικρά, με 15-60 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμόσφαιρες (45 psi). Ο ψεκασμός να γίνεται υπό συνεχή ανάδευση του ψεκαστικού υγρού και με σταθερή ταχύτητα. Μετά την εφαρμογή του προϊόντος απαιτείται βροχή ή πότισμα για την ενεργοποίηση του προϊόντος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΣΤΟΧΟΙ: Ετήσια αγρωστώδη και πηlatύφυλλα ζιζάνια*.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ		ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	γρ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)	
ΠΡΑΣΣΟ	100-140	30-60	Μεταφυτρωτικά: όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 3-5 φύλλων και τα ζιζάνια είναι μικρά (μέχρι 5 εκ.).
ΣΠΑΡΑΓΓΙ	100-150	15-40	Προφυτρωτικά: α) είτε στην επιφάνεια των σμαριών, μετά την κατασκευή τους, πριν την κάλυψη με πηλαστικό. β) είτε στην επιφάνεια του ισοπεδωμένου εδάφους (μετά το τέλος της συγκομιδής και την καταστροφή των σμαριών), το αργότερο μέχρι τέλη Ιουλίου (μέχρι και το στάδιο BBCH 08).
ΑΓΓΙΝΑΡΑ	90-140	15-40	Προφυτρωτικά: πριν το φύτεωμα της καλλιέργειας και των ζιζανίων.
ΗΛΙΑΘΟΣ	100-140	30-50	Προφυτρωτικά: αμέσως μετά τη σπορά.
ΠΑΤΑΤΑ	150-190	30-50	α) Προφυτρωτικά: μετά τη φύτευση και πριν φυτρώσει η καλλιέργεια και τα ζιζάνια. β) Μεταφυτρωτικά: με κατευθυνόμενο ψεκασμό μεταξύ των γραμμών μετά το παράχωμα των πατατοφύτων.
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ	100-190	30-50	Προφυτρωτικά: αμέσως μετά τη σπορά.
ΓΛΑΔΙΟΛΟΣ & ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΒΟΛΒΩΔΗ (Τουλίπες-Ίριδες-Νάρκοισσοι-Ζουμπούλια)	150-190	40-60	Προφυτρωτικά: μετά την φύτευση των βοηθών και πριν φυτρώσει η καλλιέργεια και τα ζιζάνια.

***Ευαίσθητα ζιζάνια:**
Ανθέμιδα, Καφέληα, Λουβουδιά, Αγριομαργαρίτα, Κοινή παπαρούνα, Κοινή πόα, Λαπάτσα, Μαρτιάκος, Άγριο σινάπι, Ζωχός, Στελλήρια, Μικρή τσουκνίδα, Αγριοελιτζάνα, Αγριοβαμβάκι, Αιματόχορτο, Αναγαλήθια, Αναρριχόμενο πολύγωνο, Αντράκλα, Ασπράγκαθο, Βλήτα, Ήμερο σινάπι, Λεπτή ήρα, Λιθόσπερμο, Μακρόκαρπη παπαρούνα, Μουχρίτσα, Νεροπιπεριά, Πολύανθη ήρα, Ραπανίδα, Σετάρια, Σπέργουλα, Αγριοντοματιά, Χαμομήλι.

***Ανθεκτικά ζιζάνια:**
Αγριόβικος (*Vicia spp.*), Αγριοβρώμη (*Avena spp.*), Αγριοράδιο (*Taraxacum spp.*), Αληπονουρά (*Alopecurus myosuroides*), Δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*), Καπνόχορτο (*Fumaria spp.*), Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Galium aparine*), Βερόνικα (*Veronica spp.*), Πολυκόμνη (*Polygonum aviculare*), Ρανούγκουθος (*Ranunculus spp.*).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:
1) Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα στο φύτεω-μα ή όταν είναι μικρά.
2) Οι μεγαλύτερες δόσεις για τα βαρεία εδάφη.
3) Σε μεταφυτρωτικές εφαρμογές να αποφεύγεται ο ψεκασμός με ζεστό καιρό (κίνδυνος φυτοτοξικότητας).
4) Να μη χρησιμοποιείται σε αμώδη, αβαθή εδάφη, γιατί οι κίνδυνοι φυτοτοξι-κότητας είναι αυξημένοι, ούτε σε οργα-νικά εδάφη (χουμώδη, τυρφώδη), γιατί η αποτελεσματικότητα είναι μειωμένη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
•Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντι-μετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα, κ.λπ.) ώστε να μει-ώνεται ο αριθμός εφαρμογών στις απο-λύτως απαραίτητες.
•Εφαρμογή σε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα άλλων ομάδων, με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:
Μη σπέρνεται και μη φυτεύετε ευαίσθητες καλλιεργείες, πριν περάσουν 4 μήνες από την εφαρμογή του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Οι σακκούλες και τα σακκίδια ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξε-πλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστρα-φούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥ-ΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Διατηρείται στην αρχική σφραγισμένη συ-σκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομη- νία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
Βλέπε επί της συσκευασίας.

Linuron

Agan

50WP

Linuron (Λινουρόν) 50% Βρέξιμη σκόνη

Εγγυημένη σύνθεση: **Linuron** 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 46,8% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλoφ.: 7927/24.09.2009
Ημερ.Λήξης Έγκρισης: 31.12.2013

Διασυστηματικό Προφυτρωτικό - Μεταφυτρωτικό Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων πηlatύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ - ΥΠΟΠΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ
ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ



Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυ-μασία και γάντια. •Αποφεύγετε την έκθεση -εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. •Φοράτε κατάλληλη μάσκα και μπότες. •Οι εργάτες πρέπει να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία και μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθαν-θείτε αδιαθεσία, αναζητήστε αμέσως ιατρι-κή συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα**, αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώμα-τος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια**, ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρ-κετά λεπτά. Εάν ο ερεθισμός παραμένει, συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτω-ση κατάποσης** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Σε περίπτωση εισπνοής**, μεταφέ-ρατε τον παθόντα από το χώρο της έκθε-σης, στον καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ν

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΜΙΑΝ ΑΨΕΚΑΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ **5** ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΗ ΣΤΟΧΟΥΣ, ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΜΙΑΝ ΑΨΕΚΑΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ **5** ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ

Τ

ΤΟΞΙΚΟ

Μέλος του

ΕΣΥΦ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΕΥΡΕΣΤΑΣΙΑΣ

02/2009-9

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 500 γρ.

