

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.
- Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
- Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
- Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεήττο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα εάν η έκθεση στο σκεύασμα είναι μεγάλη.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυνθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ο ερεθισμός επιμένει.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ο ερεθισμός επιμένει.

Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε δύο μεγάλα ποτήρια νερό. Προκαλέστε εμετό βάζοντας το δάκτυλο βαθιά μέσα στο λαιμό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος δράσης: Το imazamox (ομάδα ιμιδαζολινονών) αναστέλλει τη δράση της συνθετάσης του ακετογλακτικού (ALS).

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το ψεκαστικό βυτίο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Για τον ηλιανθό, προσθέτουμε το DASH HC υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με το υπόλοιπο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες και ποικιλίες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλή αεριζόμενο, προστατευμένο από τη ζέση, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες όχι πάνω από 20° C.

L174525 GREC/9R



syngenta®

imazamox (ιμαζαμόξ) (χημική ομάδα ιμιδαζολινονών)

Πυκνό διάλυμα (SL)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά:
70033/11-03-2013

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Imazamox 4% β/ο (4,22% άλας αμμωνίου)

Βοηθητικές ουσίες: 96% β/β

Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό, ζιζανιοκτόνο με δράση από το φύλλωμα και το έδαφος για την καταπολέμηση ετήσιων ηλαττοφυλλών ζιζανίων στον ηλιανθό.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: **BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.**

Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή, Τηλ. 210-6860130
www.basf-agro.gr

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: **Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε.**
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 666612-13

www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lte



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Χρονική διάρκεια ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Στον αγρό που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο, μπορούν να σπαρθούν την ίδια καλλιεργητική περίοδο, φασόλια, μπιζέλια ή σόγια, μετά από βεβαίωση. Να μην σπέρνονται α) Στάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, ρεβίθια, ηλιανθός ή καπνός πριν περάσουν 4 μήνες, β) Καλαμπόκι, βαμβάκι, πατάτα ή ρύζι πριν περάσουν 9 μήνες, γ) Ζαχαρότευτλα ή ελαιοκράμβη πριν περάσουν 12 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Να αποφύγεται η χρήση του σε ελαφρά εδάφη (αμμώδη, οργανική ουσία <2%, υψηλό υδροφόρο ορίζοντα), σε χαμηλές θερμοκρασίες και εντατικά αρδεύόμενες καλλιέργειες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ηλιανθός: δεν εφαρμόζεται.

Φάσμα Δράσης:

Πεδίο εφαρμογής:

Ηλιανθός (Helianthus annuus). Χρησιμοποιείται μόνο σε ποικιλίες Ηλιανθου τύπου Clearfield, οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί για ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο imazamox.

Στόχος:

Αγριοβαμβάκι, Βλήτα, Λουβουδιά, Οροβάγχη, Ποηκούμπι, Αγριοπιπεριά, Ρανούγκουλος, Μαρτιάκος, Σετάριας, Στύφνος, Βέλιουρας, Ασπράγκαθο, Αγριομειλίθια, Μουχρίτσα. **Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια:** Βούτομο, Κύπερη, Αιματόχορτο, Καπνόχορτο, Κεχρί, Φάφαρη, Αντράκλα.

Δόση: 100 κ.εκ.σ./στρέμμα (max) + 50 κ.εκ. DASH με όγκο ψεκ. υγρού 20-30 λίτρα/στρέμμα.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Μία εφαρμογή στο διάστημα μεταξύ της εμφάνισης των πρώτων 4 πραγματικών φύλλων και μέχρι την εμφάνιση των 6 πραγματικών φύλλων στο φυτό του ηλιανθού.

Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Παρατηρήσεις:

Το DASH HC είναι επιφανειοδραστικό σκεύασμα το οποίο μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του LISTEGO 4 SL.



Αρ. Παρτίδας:
Ημ/νία Παραγωγής: