




Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
Εγγ. Σύνθεση:
tembotrione 4,4% β/ο
Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: isoxadifen-ethyl 2,2% β/ο
Βοηθ. ουσίες: 93,19% β/β

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο
της ομάδας των τρικετονών για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της έγκρισης Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
7959 / 13-4-2011



ΛΑΟΥΝΤΙΣ 660D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των τρικετονών για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Παρεμποδίζει τη δράση του ενζύμου 4HPPD (αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών) προκαλώντας έντονο μεταχρωματισμό των φύλλων. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στα φύλλα 3 με 5 ημέρες μετά την εφαρμογή με το Laudis OD και τα ζιζάνια νεκρώνονται μέσα σε 2 εβδομάδες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθολικός ψεκασμός
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Αραβόσιτος

ΣΤΟΧΟΣ: Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*:

***Ευαίσθητα ζιζάνια (στη δόση 170 κ.εκ./στρ):**

Echinochloa crus-galli (μουχρίτσ), *Chenopodium album* (λουβουδιά), *Solanum nigrum* (αγριοτοματιά ή στύφνος), *Polygonum persicaria* (αγριοπιπεριά), *Amaranthus retroflexus* (τραχύ βλήτο), *Amaranthus blitoides* (πλαγιαστό βλήτο), *Digitalis sanguinalis* (αιματόχορτο), *Datura stramonium* (τάτουλας), *Polygonum lapathifolium* (λαπάτατο).

***Ευαίσθητα ζιζάνια (στη δόση 225 κ.εκ./στρ):**

Abutilon theophrasti (αγριομπομπιακιά), *Xanthium strumarium* (αγριομελιτζάνα), *Polygonum aviculare* (πολυκόμμι).

***Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια (στη δόση 225 κ.εκ./στρ):**

Setaria viridis (σετάρια πράσινη), *Setaria verticillata* (σετάρια σπονδυλωτή), *Sorghum halepense* (βέλιουρας), *Bilcladykia convolvulus* (αναρχικόμμενο πολύγωνο).

ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 170-225 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού (ελαχ-μεγ):** 30-40 λίτρα/στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Μεταφυτρωτική εφαρμογή όταν α) ο αραβόσιτος είναι στο στάδιο των 2-8 φύλλων και β) όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2 φύλλων έως την έναρξη του αδελφώματος και η πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2-8 φύλλων.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αραβόσιτος: Δεν ορίζεται λόγω πολύ ενωρίς χρόνου εφαρμογής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλαμπόκι που προορίζεται για την παραγωγή σπόρου.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργίες και δόσεις εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμένους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό, για την ασφαλή καταστροφή του.

Τα κενά υλικά συσκευασίας εξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με σχίσμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Να φοράτε μπότες κατά την εφαρμογή. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Πρώτες Βοήθειες: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: Επαφή με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως τα ρούχα και τα παπούτσια που ήρθαν σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό. Πλυνθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethylenealcol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. **Επαφή με τα μάτια:** Μετά από επαφή με τα μάτια, απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) και πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε αμέσως γιατρό. **Κατάποση:** Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα, χορηγήστε ενεργό άνθρακα. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. **Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπεία:** Συμπτωματική. Εάν έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα (μεγαλύτερη μιας μπουκιάς), χορηγήστε ενεργό (φαρμακευτικό) άνθρακα και θεϊκό νάτριο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.



Bayer CropScience

Διανομέας Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6166000,
Fax: 210 6109100



5 200309 856406 >

GR 80255977A