

MANCOZEB

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 72WP

MANCOZEB (ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ) 72%

Εγγ. σύνθεση: mancozeb 72 % β/β (ομάδα: διθειοκαρβαμικά)
Βοηθ. ουσίες: 15,3 % β/β

Βρέξιμη σκόνη (WP)
Αρ. Εγκρ. Κυκλοφ.:60301/6-9-2010

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ - ΠΡΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΚΙΛΟ

Παράσκευαστής:
Κάτοχος της έγκρισης:
United Phosphorus Limited
(United Phosphorus Group)
Chadwick House, Birchwood Park,
Warrington, Cheshire, WA36AE
Hv. Βασιλείο

Υπεύθυνος διάθεσης:
ΧΕΛΛΑΦΟΡΜ ΧΕ

Αθήνα: Φίλων 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΒΕΛΗΝΗ: Τηλ. 0610 1503, 0612 6. 0702 Σάμος: τηλ. 2310 797 907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Σουλιά Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380 22 008-9
e-mail: info@hellatam.gr

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. **Μηλιά, αχλαδιά:** για φουζιόκωδιο εφαρμογές στα στάδια της πράσινης, ροδίνης κορυφής, πτώσης πετάλων και 7-10 μέρες αργότερα. Δόση εφαρμογής: 160-220 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού (μέγιστο 220 γρ./στρέμμα). Όγκος φεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50-100. Μείγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 4 εφόσον απαιτείται. **Αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα):** Για περονόσπορο εφαρμογές όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ. και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Για φύμωση και μωμή σήψη 1-3 ανοιξιάτικες εφαρμογές κατά την έκπτυξη των σφελωμών, αμέσως μετά το σχηματισμό του 1ου φύλλου, στο στάδιο των 2-3 φύλλων. Δόση εφαρμογής: 220 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού (μέγιστο 220 γρ./ στρέμμα). Όγκος φεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.). 50-100. Μείγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Κρεμμύδια (ξηρά):** Για περονόσπορο εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Δόση εφαρμογής: 220-270 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού (μέγιστο 270 γρ./ στρέμμα). Όγκος φεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 40-100. Μείγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Τομάτα (υπαίθρου):** Για περονόσπορο εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών απορρόφων. Για σепτάρια και αλτερναρίαση εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Δόση εφαρμογής: 220 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού (μέγιστο 220 γρ./ στρέμμα). Όγκος φεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100. Μείγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Μελιτζάνα, Πιπεριά (υπαίθρου):** Για αλτερναρίαση εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Δόση εφαρμογής: 220 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού (μέγιστο 220 γρ./ στρέμμα). Όγκος φεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100. Μείγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Κολοκυθαειδή (πεπόνι, καρπούζι, κολοκίθι υπαίθρου):** Για κλαδοσπορίαση εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Δόση εφαρμογής: 220 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού (μέγιστο 220 γρ./ στρέμμα). Όγκος φεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100. Μείγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Μαρούλι (υπαίθρου):** για περονόσπορο εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Δόση εφαρμογής: 220 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού (μέγιστο 220 γρ./ στρέμμα). Όγκος φεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 60-100. Μείγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Πατάτα:** Για περονόσπορο και αλτερναρίαση εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν υψος περίπου 15-20 εκ., μετά από 7 ημέρες. Λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. Δόση εφαρμογής: 220 γρ./ στρέμμα. Όγκος φεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100. Μείγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 8 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Καρότο:** για αλτερναρία εφαρμογές με την εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. Δόση εφαρμογής: 220 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού (μέγιστο 220 γρ./στρέμμα). Όγκος φεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50-100. Μείγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Παρατηρήσεις: 1. Να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπέλια/αμπέλια σε περίπτωση χρήσης MANCOZEB ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 72 WP.** 2. Πρωτίτιπες εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. 3. Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής. 4.Είς περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων

Τρόπος εφαρμογής: Φεκασμός φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής του φεκαστικού υγρού:**Ειμίζουμε το δοχείο του φεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνταγόμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. **Τρόπος δράσης:** Το mancozeb δρα παρεμποδίζοντας το κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία. Διαδίδει ευρύ φάσμα δράσης.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το MANCOZEB ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 72 WP πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης.

Φυτοτοξικότητα: Μπορεί να προκαλέσει σκωριαζήρωση σε μηλιές "Golden Delicious". Είναι φυτοτοξικό στις παλικιές αχλαδιάς Βαυιράτα, Κόσια και Κρουστάλι.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα), Κρεμμύδια (ξηρά), Μαρούλι (υπαίθρου): 28 ημέρες, Τομάτα, Μελιτζάνα , Πιπεριά, Καρπούζι, Κολοκίθι (υπαίθρου): 3 ημέρες, Πατάτα: 7 ημέρες, Καρότο: 35 ημέρες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (σάκοι, σκάδια μαζί με τα κουτιά) αφού καταστραφούν προηγούμενως με σκόμιο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση/ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τοιλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ●Φυλάσσεται μακριά από τροφικά ποτά και ζωοτροφές. ●Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. ●Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. ●Φορέτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. ●Ες περίπτωση έκτακτης ανάγκης φάρος: αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα από το δέρμα. ●Φορέτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την αναμόρφωση ή κατάλληλες μάσκες κατά την εφαρμογή—Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό. ●Κατά την εφαρμογή στους απορριμνιστικούς χώρους χρησιμοποιήστε τη χρήση τρακτέρ με κλειστή καμπίνα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης:

Ποικες βελανιδιές-Αντίδοτα Τροφικά: Μην χρησιμοποιείτε υλικά που προκαλούν ερεθισμό εάν ο πάθος δεν διατηρεί τις ασθένειες του 1 παρασώβου υποσώβου. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το φεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Εάν ο κρεβόμος παραμένει (ήρεται στην επιφάνεια). Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Σπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξεπλύμα για αρκετά λεπτά ακόμα. Εάν παρατηρήσετε συμπτώματα συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Σητήστε αμέσως στην επιφάνεια και δώστε από το δωμάτιο 2 την επόμενη. Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον πάθονα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό. Για τον γιατρό: Φροντίδα υποστηρικτική. Ταυτόχρονη έκθεση στο αέριον κίμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το mancozeb έχει δράση διουρητική/δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλήτηπράσεων: (210) 7793777

Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ελκίριο δεδομένων ασφαλείας. ΜΗΝ ΡΥΠΑΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν απόσταση **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιεργείες του καρπού, μαρούλι, κρεμμυθού, πατάτας. **10 μέτρων** για την καλλιέργεια του αμπέλιου και **30 μέτρων** για τις δενδροειδείς καλλιεργείες

Αριθμ. Πρωτόκολλ. -Ναυρ. Παρασκευαστής -Να. Αθήνας: Ελάτε επί τη συσκευασία

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα

Πιθανός κίνδυνος δοσμένων επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. Πιθανό τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

11/13