



FARMA - CHEM SA

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 - 569 630 έως 33 FAX: 2310 - 797 047
<http://www.farmachem.gr>, e-mail: info@farmachem.gr

**ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ**

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΡΟΪΟΝ: MASAI 20 WP

Ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου εναντίον όλων των κινητών μορφών του κόκκινου και κίτρινου τετράνυχου και των θερινών αυγών τους.

Είναι βρέξιμη σκόνη (WP) με 20 % β/β δραστική ουσία (tebufenpyrad) και 79,1 % β/β βοηθητικές ουσίες.

Κάτοχος της έγκρισης: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Διανομή: FARMA-CHEM S.A.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείστε το στην αρχική του συσκευασία, καλά κλεισμένη, σε μέρος δροσερό καλά αεριζόμενο, ξηρό και σε θερμοκρασία κάτω των 40°C, μακριά από πηγές θερμότητας, ανοικτή φλόγα ή σπινθήρα. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις:

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Για Κόκκινο Τετράνυχο (*Panonychus ulmi*) με 35-50 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50γρ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Την άνοιξη όταν έχει εκκολαφθεί το 75% των χειμερινών αυγών ή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρεϊπ φρούτ): Για Κόκκινο Τετράνυχο (*Panonychus ulmi*) και Κίτρινο Τετράνυχο (*Tetranychus urticae*) με 50 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100-200γρ. σε 200-400 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Την καλοκαιρινή περίοδο (Μάιος-Ιούνιος) ή το φθινόπωρο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος) εφόσον οι πληθυσμοί των τετρανύχων φτάσουν τις 2-4 κινητές μορφές ανά φύλλο. Αν η προσβολή εντοπίζεται σε κηλίδες, να ψεκάζονται μόνο οι προσβεβλημένες περιοχές του οπωρώνα.

Μέγιστος αριθμός εφαρνογ ανά καλλιεργητική περίοδο:

1 επέμβαση για όλες τις καλλιέργειες.

Παρατηρήσεις:

- 1) Η πίεση ψεκασμού πρέπει να είναι υψηλή, για την επίτευξη καλής διαβροχής και πλήρους κάλυψης των δέντρων.
- 2) Δεν πρέπει να εφαρμόζεται στην ίδια καλλιεργητική περίοδο με τα ακαρεοκτόνα PRIDE 20 SC (fenazaquin 20%), και NEXTER 20 EC (pyridaben 20%), και με ακαρεοκτόνα που περιέχουν τη δραστική ουσία fenpyroximate, με τα οποία εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα και εφόσον υπάρχει ανάγκη

περισσότερων της μίας εφαρμογών, να χρησιμοποιείται ακαρεοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης.

- 3) Να μην εφαρμόζεται περισσότερο από μία (1) φορά σε κάθε κάλλιεγνητική περίοδο.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί καλύψεως μέχρις απορροής.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε κατά το 1/3 το ψεκαστικό βυτίο και ρίχνουμε τον απαιτούμενο αριθμό υδατοδιαλυτών σάκων χωρίς να τους ανοίξουμε. Απογεμίζουμε το ψεκαστικό με νερό υπό συνεχή ανάδευση. Το σκεύασμα είναι διαβρωτικό στον ορείχαλκο και τον μαλακό χάλυβα.

Φυτοτοξικότητα:

Στη συνιστώμενη χρήσης και δόση εφαρμογής το MASAI 20 WP δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα.

Συνδυαστικότητα:

Να αποφεύγεται ο συνδυασμός του με άλλα σκευάσματα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλιά, Αχλαδιά: 21 ημέρες. Εσπεριδοειδή: 14 ημέρες.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.