

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μη τρώτε, μη πίνετε ή καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια από PVC. • Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. • Μην εισέρχεσθε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό. • Μην ψεκάζετε αντίθετα από τον άνεμο. • Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

• Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του
• Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φυτοτοξικότητα: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με το εντομοκτόνο INSEGAR. Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

Τελευταία ασφαλής επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Τομάτα (Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Θ), Μελιτζάνα (Θ): 7 ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική του συσκευασία μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο και σε θερμοκρασία από -5° C έως +35° C για 2 χρόνια.

L150205 GREC/7N

Match[®]
5 EC

syngenta[®]

Lufenuron 5% (Ιουφενουρόν)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Γεωργίας: 1691/21.01.98
Ημερ. λήξης εγκρ. κυκλ.φ.: 31-6-2014

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: lufenuron 5% β/ο
βοηθητικές ουσίες 95,48% β/β,
περιέχει: heavy aromatics (solvent naphtha)

Εντομοκτόνο παρεμποδιστής ανάπτυξης με κύρια δράση από στομάχου και ασθενή δράση δι' επαφής.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: **Syngenta Crop Protection AG**
Basel, Switzerland
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: **Syngenta Hellas A.E.B.E.**
Ανθούσα Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3
www.syngenta.gr
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: **Syngenta Hellas A.E.B.E.**
Οινόφυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 2262 051600

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lt e

XI



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

• Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό/εγκαυστική ο' επαφή με το δέρμα.

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Κατηγορία και Τρόπος δράσης:

Το MATCH 5 EC είναι εντομοκτόνο παρεμποδιστής ανάπτυξης. Επενεργεί στην έκδυση (μεταμόρφωση) των προνυμφών, με το να παρεμποδίζει τη σύνθεση της χητίνης, προξενώντας το θάνατό τους. Επενεργεί επίσης στα έμβρυα των εντόμων. Δρα από στομάχου. Έχει επίσης ασθενή δράση δι' επαφής

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Εχθροί	Δόσεις			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογ./καλλιέργ. περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		Κ.εκ./100 lt ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (lt/στρ.)	Κ.εκ. σκευ. (ml/στρ.)		
Τομάτα, (θερμοκνήσιου) Πιπεριά, (θερμοκνήσιου) Μελιτζάνα (θερμοκνήσιου) Αγγούρι (θερμοκνήσιου)	Θρίπας Καλιφόρνιας (Frankliniella occidentalis)	150	50-150	225	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη εφόσον χρειαστεί	3/14-21 (στο αγγούρι: 2/14-21)
	Σποντόπτερα (Spodoptera exigua) Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera)	40-60*	50-150	90	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη εφόσον χρειαστεί	

* Οι μεγάλες δόσεις χρησιμοποιούνται όταν έχουμε έντονη προσβολή και όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται στο μέγιστο της ανάπτυξης τους.



Αριθμ. παρτίδας: Βλέπε φιάλη
Ημ. παραγωγής: Βλέπε φιάλη