

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

1) Ψεκασμός φυλλώματος. 2) Με πότισμα στα σπορεία.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:**

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύουμε τη συνιστώμενη δόση σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση και εφαρμόζουμε μέσα σε λίγες ώρες.

**ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

**ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπ φρουτ-Λεμονιά-Μανταρινιά-Πορτοκαλιά):** Μύκητες εδάφους (Πύθιο, Φυτόφθορα). α) Εφαρμογή σε σπορεία. Δόση: **7 γρ./μ<sup>2</sup>**. β) Εφαρμογή σε φυτώρια. Δόση: **14 γρ./μ<sup>2</sup>**. Ακολουθεί ενσωμάτωση ή πότισμα. **ΑΜΠΕΛΙ:** Περονόσπορος. Δόση: **250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Γίνονται 2-3 διαδοχικοί ψεκασμοί κάθε 14 ημέρες κατά την περίοδο ταχείας αύξησης της βλάστησης (παραμονές άνθησης μέχρι λίγο μετά το τέλος της). **ΠΑΤΑΤΑ:** Περονόσπορος. Δόση: **300 γρ./στρ.** Γίνονται 2-3 προληπτικοί ψεκασμοί κάθε 14 ημέρες κατά την περίοδο έντονης ανάπτυξης της καλλιέργειας. Οι ψεκασμοί αρχίζουν όταν τα φυτά στη γραμμή φύτευσης έχουν ενωθεί (κλείσει) ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Εντός 7 ημερών από την τελευταία εφαρμογή, χρησιμοποιήστε ένα άλλο προστατευτικό μυκητοκτόνο. **ΚΑΠΝΟΣ:** α) Στο σπορείο. Μύκητες εδάφους (Πύθιο, Φυτόφθορα), Περονόσπορος. Δόση: **250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Με πότισμα ή ψεκασμό φυλλώματος κάθε 10 ημέρες, αρχίζοντας από το «σταύρωμα» του φυττανιού. Η τελευταία εφαρμογή γίνεται 1-2 ημέρες πριν τη μεταφύτευση ή μπορεί να γίνει εμβάπτιση του φυττανιού σε ίδιο διάλυμα 0,25-0,30% πριν τη μεταφύτευση. β) Στο χωράφι. Περονόσπορος. Δόση: **250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Ένας ψεκασμός φυλλώματος, 10-15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. Φυτόφθορα. Δόση: **1500 γρ./στρ.** Μία εφαρμογή με το νερό της μετα-φύτευσης. **ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ & ΔΕΝΔΡΑ:** Μύκητες εδάφους (Πύθιο, Φυτόφθορα). Δόση: **1-2 γρ./μ<sup>2</sup>**. Εφαρμογή σε σπορεία ή φυτώρια σε όλη την επιφάνεια. Ακολουθεί ενσωμάτωση ή πότισμα.

**Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):** Αμπέλι (50-150), Πατάτα-Καπνός (50-100).

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:**

Εσπεριδοειδή-Αμπέλι-Πατάτα-Καπνός (στο σπορείο)-Καλλωπιστικά: 3, Καπνός (στο χωράφι): 2.

**Μεσοδιάστημα επεμβάσεων (ημέρες):** Αμπέλι-Πατάτα (14), Καπνός (στο σπορείο) (10).

### Παρατηρήσεις:

Σε περίπτωση εμφάνισης ανθεκτικών φυλών του περονόσπορου, συνιστάται η χρήση ενός μυκητοκτόνου διαφορετικού τρόπου δράσης (να μην περιέχει δραστικό συστατικό της ομάδας των φαινυλγαιδιδίων).



**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**

Αμπέλι: Λίγο μετά την άνθηση.

Πατάτα: 28 ημέρες.

Καπνός: 63 ημέρες.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:**

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Για εφαρμογή σε σπορεία καπνού, πρέπει να προηγούνται δοκιμαστικές εφαρμογές λόγω ευαισθησίας που παρουσιάζουν κάποιες ποικιλίες.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:**

Δε συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης. Για νέα δραστικά συστατικά συστήνεται δοκιμή σε μικρή κλίμακα.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά συσκευασίας (σακούλλες, σάκοι) μαζί με τα κουτιά, που θα καταστραφούν προηγουμένως ως σκόσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ -  
ΣΥΝΟΤΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗ-  
ΞΗΣ:**

Αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και σε κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:**

Βλέπε επί της συσκευασίας.



Εγγυημένη σύνθεση: **Metalaxyl** 7,5% β/β  
**Mancozeb** 56% β/β  
 Βοηθητικές ουσίες: 26,23% β/β

Αρ.Εγκρ.Κυκλ.Οφ.: 6822/29.05.2001

Ημερ. Λήξης Έγκρισης: 30.06.2014

## Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**  
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες


ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Κάτοχος της έγκρισης: **IQV Italia Srl - Ιταλία**

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-  
Παρασκευαστής-Εργοστάσιο παρασκευής:  
**Industrias Químicas del Valles S.A. - Ισπανία**

Υπεύθυνος επικοινωνίας: **Ανοργκαχήμ ΑΕ**  
Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα

Συσκευαστής-Διανομέας:  
**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
 Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι  
 Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559  
 Θεσσ./νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία  
 Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453  
 Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ  
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ  
ΓΙΑ ΤΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 500 γρ.**



01/2011-6