

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. •Να φοράτε καπέλο κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, μακριά από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως, μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.



05/2009-7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



Tau-Fluvalinate (Φλουβαλινέιτ) 24%
Γαλάκτωμα (emulsion, EW)

Εγγυημένη σύνθεση: **Tau-Fluvalinate** 24% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 75,9% β/β
Αρ.Έγκρ.Κυκλ.οφ.: 1527/12.5.1988

Εντομοκτόνο της ομάδας των συνθετικών πυρεθρινών με δράση επαφής και στομάχου

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες



Παρασκευαστής:
Invita Plant Protection N.V. - Curacao,
Netherlands Antilles

Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:
Makhteshim Chemical Works Ltd. - Ισραήλ

Αντιπρόσωπος-Συσκευαστής- Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΜΑΒΡΙΚ:

Εντομοκτόνο της ομάδας των συνθετικών πυρεθρινών με δράση επαφής και στομάχου. Σημείωση: Το **Mavrik** έχει αρχή αρχική δράση. Η πλήρης αποτελεσματικότητα του διαπιστώνεται 3-4 ημέρες μετά την εφαρμογή.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΟΡΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: Αφίδες, Θρίπες. Δόση: 20 κ.εκ/100 λίτρα νερό. Ανάρσια, Φυλλοδέστες. Δόση: 40 κ.εκ/100 λίτρα νερό. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά-Αχλαδιά):** Καρπόκαψα, Νάρκη. Δόση: 60 κ.εκ/100 λίτρα νερό. Αφίδες. Δόση: 20 κ.εκ/100 λίτρα νερό. Φυλλοδέστες, Ψύλλοι. Δόση: 50-60 κ.εκ/100 λίτρα νερό. Έχει δευτερεύουσα δράση στις κινητές μορφές τετρανύχων. **ΕΛΠΕΡΙΔΕΙΔΗ:** Αφίδες, Λεκάριο. Δόση: 20 κ.εκ/100 λίτρα νερό. Ανθοσφήκες. Δόση: 30-40 κ.εκ/100 λίτρα νερό. Έχει δευτερεύουσα δράση στις κινητές μορφές τετρανύχων. **ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ:** Αφίδες, Θρίπες, Κινητές μορφές τετρανύχων, Φυλλοσφάγες κάμπιες Πεπιδωπτερών, Αλευρώδης, Τζιτζικιά, Λύγκος. Δόση: 20-40 κ.εκ/100 λίτρα νερό. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Λύγκος. Δόση: 40-50 κ.εκ/στρ. με 50-70 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα. Γίνεται 1 εφαρμογή/καλλιεργητική περίοδο. Αφίδες, Θρίπες. Δόση: 10-20 κ.εκ/ στρ. Πρόσδιο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι. Δόση: 30-40 κ.εκ/στρ. Κόκκινος τετρανύχος (κινητές μορφές). Δόση: 50 κ.εκ/στρ. **ΜΗΛΙΚΗ:** Αφίδες. Δόση: 30 κ.εκ/στρ. **ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμες ποικιλίες):** Κινητές μορφές τετρανύχων. Δόση: 30 κ.εκ/100 λίτρα νερό. **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ:** Αφίδες, Θρίπες. Δόση: 20 κ.εκ/100 λίτρα νερό. Ανάρσια, Φυλλοδέστες. Δόση: 50-60 κ.εκ/100 λίτρα νερό. Εφαρμογή από τη ρόδινη κορυφή μέχρι το τέλος της άνοιξης (στάδια BBCH 57-BBCH 69).

Σε όλες τις καλλιεργίες, εφαρμογές με την έναρξη της προσβολής.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):

Αμυγδαλιά-Μηλοειδή-Εσπεριδοειδή-Καλλωπιστικά, Ροδακινιά (100), Βαμβάκι (50-80), Μηδική-Αμπέλι/οινοποιήσιμες ποικιλίες (50-100).

Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ-ιεργητική περίοδο:

Αμυγδαλιά-Μηλοειδή-Εσπεριδοειδή-Καλλωπιστικά-Μηδική-Βαμβάκι (2).
Αμπέλι (οινοποιήσιμες ποικιλίες)-Ροδακινιά (1).

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλιά, Αχλαδιά: 90 ημέρες.
Εσπεριδοειδή: 28 ημέρες.
Αμυγδαλιά, Οινοποιήσιμα σταφύλια: 21 ημέρες.
Βαμβάκι, Μηδική: 7 ημέρες.
Ροδακινιά: 56 ημέρες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Συνδυάζεται με όλα τα γεωργικά φάρμακα εκτός εκείνων με αλκαλική αντίδραση. Πριν τη χρήση του συνιστάται δοκιμή συνδυαστικότητας. Οι βρέξιμες σκόνες να διαλύονται πρώτες στο ψεκαστικό διάλυμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανάκυκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μέλος του

