



Captan (Καπτάν) 80%
Βρέξιμοι κόκκοι

ΜΕΡΠΑΝ 80%: Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Με ψεκασμούς καλύψεως.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: Φαιά σήψη. Εφαρμογή: α) Αρχή της άνθησης, β) Πλήρης άνθηση. Κορύνεο. Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης. Δόση: **150 γρ./100 λίτρα νερό. ΜΗΛΙΑ:** Φουζικλάδιο. Δόση: **150 γρ./100 λίτρα νερό.** Εφαρμογή: 1) Πράσινη κορυφή, 2) Ρόδινη κορυφή, 3) Πτώση πετάλων, 4) 15-20 ημέρες αργότερα (καρπίδιο). **ΑΧΛΙΑΔΙΑ:** Φουζικλάδιο. Δόση: **150 γρ./100 λίτρα νερό.** Εφαρμογή: 1) Πράσινη κορυφή, 2) Λευκή κορυφή, 3) Πτώση πετάλων, 4) 15-20 ημέρες αργότερα. **ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ:** Φαιά σήψη. Εφαρμογές στην περίοδο της άνθησης: 1) Ρόδινη κορυφή, 2) 50% άνθηση, 3) Πλήρης άνθηση, 4) Αμέσως μετά την πτώση των πετάλων. Κορύνεο. Εφαρμογές άνοιξης, αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης. Εξώασκος. Μία (1) εφαρμογή πριν τη διόγκωση των οφθαλμών. Δόση: **150 γρ./100 λίτρα νερό. ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ:** Φαιά σήψη. Εφαρμογές στην περίοδο της άνθησης: 1) Ρόδινη κορυφή (για την κερασιά στο 10% της άνθησης), 2) 50% άνθηση, 3) Πλήρης άνθηση, 4) Πτώση πετάλων. Κορύνεο. Εφαρμογές άνοιξης, αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης. Εξώασκος. Μία (1) εφαρμογή πριν τη διόγκωση των οφθαλμών. Δόση: **150 γρ./100 λίτρα νερό. ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:** Αλτερναρίωση, Τεφρά σήψη, Σεπτορίωση. Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα. Προσβολή θαιμού. Μία (1) εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα. Δόση: **150 γρ./100 λίτρα νερό. ΠΙΠΕΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:** Αλτερναρίωση, Τεφρά σήψη. Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα. Προσβολή θαιμού. Μία (1) εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα. Δόση: **150 γρ./100 λίτρα νερό. ΠΕΠΟΝΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:** Τεφρά σήψη. Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα. Προσβολή θαιμού. Μία (1) εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα. Δόση: **150 γρ./100 λίτρα νερό. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ:** Προσβολή θαιμού. Δόση: **150 γρ./100 λίτρα νερό.** Μία (1) εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού/στρ.: Αμυγδαλιά (100-150), Μηλιά-Αχλαδιά (100-200), Βερυκοκιά-Κερασιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Δαμασκηνιά (100-250), Τομάτα-Πιπεριά-Πεπόνι υπαίθρου-Καλλιωπιστικά (50-100).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: Μηλιά-Αχλαδιά-Βερυκοκιά-Κερασιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Δαμασκηνιά (4), Τομάτα-Πιπεριά-Πεπόνι υπαίθρου (3), Αμυγδαλιά (2), Καλλιωπιστικά (1).

Παρατηρήσεις:

- 1) Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση ακάρεων.
- 2) Μην ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Να αποφεύγεται η είσοδος σε έκταση που ψεκάστηκε με **Merpan 80** επί 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμυγδαλιά: στην πλήρη άνθηση.

Μηλιά-Αχλαδιά: στο στάδιο του καρπιδίου.

Βερυκοκιά: **21 ημέρες.**

Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Δαμασκηνιά-Κερασιά: στην **πτώση των πετάλων.**

Τομάτα-Πιπεριά (υπαίθρου): στο **τέλος της πρώτης ανθοφορίας.**

Πεπόνι (υπαίθρου): **21 ημέρες.**

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Μερικές ποικιλίες μηλιάς (π.χ. Red Delicious, Wine-Sar) και αχλαδιάς (π.χ. D'Αηλου, Bosc) μπορεί να πάθουν ζημιά, όπως και μερικοί σπόροι λαχανικών, καθώς και σε μεγάλες δόσεις, σπόροι τομάτας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακκούλινες, κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε μέρος καλή αεριζόμενο, ξηρό, δροσερό, μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.



Captan (Καπτάν) 80%
Βρέξιμοι κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση: **Captan** 80% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 12,09% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλοφ.: 6593/23.7.93

Ημερ.Λήξης: 30.09.2011

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται **μόνον για επαγγελματίες χρήστες**
Απαγορεύεται η χρήση του στα θερμοκήπια

ΕΠΙΠΛΗΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΥΠΟΠΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ



Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσ/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Μέλος του



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

21 07793777.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΑΗΤΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 750 γρ.

03/2008-6