



ΠΡΟΪΟΝ:
METALDEHYDE FARMA-CHEM 5GB

Κοχλιολειματοκτόνο για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων. Δρα από στομάχου

Είναι Κοκκώδες δόλωμα (GB) με 5% β/β δραστική ουσία Metaldehyde και 94.90% β/β βοηθητικές ουσίες.

Σταθερότητα στην αποθήκευση:

Διατηρούμενο στους $0\pm 1^{\circ}\text{C}$ για 7 ημέρες παραμένει σταθερό. Διατηρούμενο στους $52\pm 2^{\circ}\text{C}$ για 14 ημέρες, η μέση περιεκτικότητα σε δρών συστατικό δεν θα είναι μικρότερη από 48,5 g/kg. Συνίσταται να αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Σταθερότητα:

-**στον αέρα:** Σταθερό σε κλειστή ή ανοιγόμενη για 1-2 ημέρες και κλειόμενη μετά συσκευασία για 2 χρόνια.

-**στο φως:** Σταθερό στο ηλιακό φως για 2 χρόνια.

-**στο νερό:** Υδρολύεται ταχύτατα σε ακεταλδεύδη. (Περίοδος ημιζωής 6 ημέρες)

- **σε διάφορα pH:** Αποφύγετε όξινα διαλύματα

- **σε διάφορες θερμοκρασίες:** Σταθερό σε κανονικές θερμοκρασίες για 2 χρόνια.

- σε διάφορα υλικά συσκευασίας: Σταθερό στα δηλούμενα υλικά συσκευασίας για 2 χρόνια (Σακούλα πολυαιθυλενίου, κουτιά χάρτινα με εσωτερική σακούλα πολυαιθυλενίου, σάκοι χάρτινοι τρίφυλλοι, με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου, σάκοι πολυαιθυλενίου τυπωμένοι).

Φυσικά και Χημικά στοιχεία: Το METALDEHYDE FARMA-CHEM 5GB είναι κοκκώδες δόλωμα, με μπλε χρώμα και μηδαμινή οσμή. Είναι εύφλεκτο με σημείο ανάφλεξης $50-55^{\circ}\text{C}$. Δεν είναι διαβρωτικό και εκρηκτικό. Σε διάλυμα 1% δίνει pH 8-12. Η περιεκτικότητά του σε νερό είναι max 5%. Όσον αφορά τη λεπτότητα των κόκκων το 95% περνάει από 2-8 mm sieve.

Συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις:

Σπορεία, Φυτώρια, Λαχανόκηποι, Ανθοκομικές καλλιέργειες, Δενδρώνες, Αμπελώνες, Καλλιεργούμενοι αγροί. Ο εχθρός αφορά **Κοχλίες** (Σαλιγκάρια) και **Γυμνοσάλιαγκες** (Λείμακες, Αρίονες) με δόση 0.7-1 Kg/στρέμμα.

Εφαρμογή μόλις εμφανιστούν οι κοχλίες και οι λείμακες κατά προτίμηση σε υγρό έδαφος μετά από βροχή ή πότισμα το απόγευμα. Επανάληψη της εφαρμογής σε έντονες προσβολές ή μετά από ισχυρές βροχές.

Για ευαίσθητες καλλιέργειες συνιστώνται προληπτικές επεμβάσεις κατά τη σπορά ή μετά τη σπορά ή φύτευση/μεταφύτευση.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3.

Παρατηρήσεις:

α) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του πληθυσμού των κοχλίων/λειμάκων. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες η ποσότητα του σκευάσματος ανά δέντρο είναι περίπου 30 g. β) Η εφαρμογή του φαρμάκου γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο όταν τα σαλιγκάρια είναι σε δραστηριότητα. γ) Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή. δ) Να αποφεύγεται το πότισμα για τουλάχιστον δύο (2) ημέρες μετά την εφαρμογή του δολώματος.

Τρόπος εφαρμογής:

Σκορπίζεται μόνο με κατάλληλο εξοπλισμό διασποράς κοκκωδών σκευασμάτων γύρω από τα φυτά και τα δένδρα. Εφαρμόζεται και στη γραμμή σποράς σε πλάτος 20 εκ. ή σε λωρίδες γύρω από τις καλλιέργειες για να εμποδίσει τη μετανάστευση των σαλιγκαριών από άλλες περιοχές.

Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:

1. Κατά τη εφαρμογή το δόλωμα να μην έρχεται σε επαφή με τα εδάδιμα μέρη των φυτών που είναι έτοιμα προς κατανάλωση.
2. Μπορούν να γίνουν τρεις (3) εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και τρόπο εφαρμογής.

Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την περιοχή εφαρμογής του δολώματος για τουλάχιστον 14 ημέρες. Κρατείστε τα κοτόπουλα μακριά από την περιοχή του δολώματος για τουλάχιστον 7 ημέρες.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.