

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Φοράτε κατάλληλες μπότες. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον επιβεβαιωθεί στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα θεωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάποσης,** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Χρησιμοποιήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μη χρησιμοποιείτε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. **Σε περίπτωση εισπνοής,** μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, διατηρήστε τον ζεστό και ξεκουράστε. Ανευβουβείτε παρατηρητικά οι γιατροί. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Η χρήση στρόφινης και οξέλης δεν ενδείκνυται. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΞΙΣΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ: -Να εφαρμόζονται ενυψωτικές μεθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μεθοδος, καλλιεργητικό μέτρο, κ.λπ.), όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται ενυψωτική διακονικότητα (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανεπιθύμητων ζιζανίων στη δραστηρία ουσία glyphosate. -Σε αρνητικά και σταγαιακά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα προνή και με τρόπο ώστε σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην πάνε στο νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλη τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος θα ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αποστέλλονται όλη σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική διαστήματα ασφαλείας:

Σε αγρούς μετά τη συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεροσθαεί διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και 14 ημερών για τα πολυετή ζιζάνια, πριν την κατεργασία του εδάφους. Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 7 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική οργανωμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αερισμένο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΟΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



Glyphosate (Γλυφοζέιτ) 36%
Πυκνό διάλυμα

Εγγυημένη σύνθεση: **Glyphosate οξύ 36% β/ο**
(υπό μορφή δίπλου ισοπροπιλαμίνης: 48,6%)
Βοηθητικές ουσίες: 57% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλόφ./Ημ.Λήξης: 7443/22.06.1993/30.06.2012

**Διασυστηματικό μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο
κατά ετήσιων & πολυετών αγρωστωδών,
πλητύφυλλων και υδροχαρών ζιζανίων και
οροβάγχης του καπνού**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ



Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και οήσημον-Συσκευαστής-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559

Θεσσα/νίκης: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάννα

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

ΜΕΤΕΩΡ:

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλητύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξηλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού. Απορροράται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναετέλλοντας τη βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φυλλώμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγή των υποαδρευσών υποσημμάτων στους καρπούς. Για την οροβάχνη στον καπνό, εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό καλύψεως της φυτείας. Χρησιμοποιεί μπεκ τύπου ακούσης και ψεκαστές με μέση μικρότερη από 2 atm (35 psi).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστάμενη δόση του ανακυμωμένου. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μην χρησιμοποιεί ακάθαρτο ή ακρινό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΜΕΤΡΙΣΤΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΩΝ (Πορτοκαλιά-Μανταρινιά-Λεμονιά-Γκρέιφ φρουτ-Κιτριά)-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΙΑ-ΔΙΑΤΡΥΦΗΚΟΝΑΡΙΑ (Βερυκοκιά-Νεκταρινιά-Ροδάκινα-Κερσάδι)-ΑΜΠΕΛΙΑ (επιτραπέζια & οινό- ποτήσιμα)-ΕΛΙΑ (ετήσια ζιζάνια) (αγρωστωδών και πλητύφυλλα). Δόση: 150-200 κ.ε./στρέμμα. Μοδόνα, Τσουκνίδα, Πολυκόμμι, Αντράχλα. Δόση: 400-600 κ.ε./στρέμμα. Όταν τα ζιζάνια βλασκονται στο στάδιο της ζωής της ανάπτυξης. Μέγιστο 2 εφαρμόσεις/καλή περίοδο. Πολυετή ζιζάνια: Αγριόδα. Δόση: 750-1000 κ.ε./στρέμμα. Βέλιουρος, Φτέρη. Δόση: 500 κ.ε./στρέμμα. Περικακόδα. Κιόριο. Δόση: 1000 κ.ε./στρέμμα. 1 εφαρμόση όταν τα ζιζάνια βλασκονται κοντά στην άνθρω, κατά την άνθρω ή λίγο μετά από αυτή. Κύπρη. Δόση: 1η εφαρμόση κατά την άνθρω με 600 κ.ε./στρέμμα, 2η εφαρμόση σε περίπτωση αναβλάστησης με 500 κ.ε./στρέμμα. Μέγιστο: 2 εφαρμόσεις/καλή περίοδο. **ΒΑΜΒΑΚΙ** Δόση: Ετήσια ζιζάνια (αγρωστωδών και πλητύφυλλα). Δόση: 150-200 κ.ε./στρέμμα. Πολυετή ζιζάνια (βέλιουρος). Δόση: 500 κ.ε./στρέμμα. 1 εφαρμόση με κατευθυνόμενο ψεκασμό μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της ανόησης. **ΚΑΠΝΟΣ** Οροβάχνη. Δόση: 40 κ.ε./στρέμμα. Εφαρμόση με ψεκασμό καλύψεως, 40 ημερές μετά τη μεταρύτεση. β) 60 κ.ε./στρέμμα. Εφαρμόση με ψεκασμό καλύψεως, 60 ημερές μετά τη μεταρύτεση. Μέγιστο 2 εφαρμόσεις/καλή περίοδο. **ΑΓΡΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΚΟΜΙΗ ΤΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ή ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ:** Ετήσια ζιζάνια (αγρωστωδών και πλητύφυλλα). Δόση: 150-200 κ.ε./στρέμμα. Μοδόνα, Τσουκνίδα, Πολυκόμμι, Αντράχλα. Δόση: 400-600 κ.ε./στρέμμα. 1 εφαρμόση όταν τα ζιζάνια βλασκονται στο στάδιο της ζωής της ανάπτυξης. Πολυετή ζιζάνια: Δόση: 500-1000 κ.ε./στρέμμα (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου, ως ανατέρας). 1 εφαρμόση όταν τα ζιζάνια βλασκονται κοντά στην άνθρω, κατά την άνθρω ή λίγο μετά από αυτή. **ΑΚΑΜΑΙΕΡΓΕΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣ:** Ετήσια ζιζάνια (αγρωστωδών και πλητύφυλλα). Δόση: 150-200 κ.ε./στρέμμα. Μοδόνα, Τσουκνίδα, Πολυκόμμι, Αντράχλα. Δόση: 400-600 κ.ε./στρέμμα. Εφαρμόσεις όταν τα ζιζάνια βλασκονται στο στάδιο της ζωής της ανάπτυξης. Μέγιστο 2 εφαρμόσεις/καλή περίοδο. Πολυετή ζιζάνια: Δόση: 500-1000 κ.ε./στρέμμα (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου, ως ανατέρας). 1 εφαρμόση όταν τα ζιζάνια βλασκονται κοντά στην άνθρω, κατά την άνθρω ή λίγο μετά από αυτή. Ξηλωδείς θάμνοι, βότα, κ.λπ. Δόση: 500-1000 κ.ε./στρέμμα. 1 εφαρμόση όταν βλασκονται σε πληρη ανάπτυξη. **ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ή ΣΤΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ:** Υδροχαρή ζιζάνια. Δόση: 800-1000 κ.ε./στρέμμα. 1 εφαρμόση κοντά ή πριν την άνθρω των ζιζανίων.

(*) Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται **συνήθως 1-2 εφαρμόσεις** (κεμίδια-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο), ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιεργία, όταν τα ζιζάνια βλασκονται στο στάδιο της ζωής της ανάπτυξης. (**) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται **συνήθως 1 εφαρμόση**, όταν τα ζιζάνια βλασκονται κοντά στην άνθρω, κατά την άνθρω ή λίγο μετά από αυτή. (***) Στο **βαμβάκι**, ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών, πριν την έναρξη της ανόησης της καλλιεργίας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το στέλεχος και το φυλλώμα των φυτών. Προτείνεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτήρων) γύρω από τα μπεκ.

Παρατηρήσεις: 1) Στις δεινωδείς καλλιεργίες και στα αμπέλια, ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλα, τρυφερούς βλαστούς, παραρρυδίες και μη επουλωμένους πηγείς κλαδωδείς. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους σπιννώνες ή αμπελιανούς από το 3ο έτος και τη φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 2) Για τα πλητύφυλλα ζιζάνια: μοδόνα, τσουκνίδες, πολυκόμμι, αντράχλα, η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ.ε./στρέμμα, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους. 3) Για την άνθρω, η εφαρμόση γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκ. 4) Για τη φτέρη, η εφαρμόση να γίνεται με το ξεπλύσιμο της κορυφής. 5) Να μη γίνεται ψεκασμός, αν ανέμεση βόρνη ή σε 6 ημερές. 6) Να μη χρησιμοποιεί σε καλλιεργίες που παραρρυδίζονται για παραρρυδισμό. 7) Μην βάζετε όταν φυσάει. 8) Να μη χρησιμοποιεί σε καλλιεργίες που παρρρυδίζονται υπόγειο βλαστούς προλόν πριν τη συγκομιδή τους. 9) Για τις επιτραπέζιες ελίες, επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.

Μέλος του

