

MILBEKNOCK^{1EC}

MILBEKNOCK^{1EC}

ΠΕΔΙΟ-ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά: για Κόκκινο τετράνυχιο με δόση 100 -135 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80-200 κ.εκ./ στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή μετά την πτώση των πετάλων και με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών στα φύλλα. Επανάληψη της εφαρμογής εάν επανεμφανιστεί προσβολή. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα 14-21 ημερών. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 80-150.

Φράουλα (υπαίθρου και θερμοκηπίου): για Κίτρινο τετράνυχιο και Κόκκινο τετράνυχιο με δόση 100-150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100-150 κ.εκ./ στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Επανάληψη της εφαρμογής εάν επανεμφανιστεί προσβολή. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα 14-21 ημερών. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 100.

Πορτοκαλιά, Μανταρινιά: για Κίτρινο τετράνυχιο, Κόκκινο τετράνυχιο και Φυλλοκνίστη με δόση 150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 300 κ.εκ./ στρέμμα. Μία εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Η προσθήκη θερμού πολτού (στις εγκεκριμένες δόσεις συνδυαστικότητας με εντομοκτόνα/ακαρεοκτόνα) σε μίγμα βυτίου με το MILBEKNOCK EC, μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια δράσης του κατά του φυλλοκνίστη. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 200.

Καλλωπιστικά Θερμοκηπίου: για Κίτρινο τετράνυχιο με δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-35 κ.εκ./ στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Επόμενες εφαρμογές εφόσον επανεμφανιστεί προσβολή. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 7-14 ημερών. Εφόσον υπάρχουν διαφορετικά είδη φυτών ή διαφορετικά βλαστικά στάδια στο ίδιο θερμοκήπιο μπορούν να γίνουν μέχρι 10 εφαρμογές . Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50-70.

Παρατηρήσεις:
Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την πυκνότητα του πληθυσμού. **Διευκρίση ανθεκτικότητας**
-Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιοριστεί ο πληθυσμός των ακάρεων/εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.

-Εφαρμογές, μόνο όταν είναι απαραίτητο, την κατάλληλη χρονική στιγμή και με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα αρθρόποδα.

-Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.

MILBEKNOCK^{1EC}

- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με MILBEKNOCK EC, καθώς και με σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες της ίδιας ομάδας (milbemycins) όπως η δ.ο. abamectin. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με ακαρεοκτόνα/εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
-Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/ετόμων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμο πλήρους κάλυψης του φυλλώματος με καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε τη συστασμένη δόση του σκευάσματος αναδύοντας. Συμπληρώνουμε το δοχείο με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιεργίες και στις συστασμένες δόσεις εφαρμογής. Για τις καλλιεργίες των καλλωπιστικών, εκτός της τριανταφυλλιάς, συνιστάται δοκιμή φυτοτοξικότητας μικρής έκτασης. Να μη χρησιμοποιείται σε ανθισμένα χρυσάνθεμα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα ή σχίσμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Προστασία των καταναλωτών (Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή): Μηλιά:14 ημέρες, Φράουλα:1 ημέρα, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά: 14 ημέρες. Καλλωπιστικά θερμοκηπίου: Μη εφαρμοσμο

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο σκοτεινό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και μακριά από πηγές θερμότητας και φλόγα.

Ημ. παρασκευής, Ημερ. λήξης, Αρ. Πορίδας: Βάλετε επί της συσκευασίας.

MILBEKNOCK^{1EC}

Milbemectin (Μιλμπεμεκτίν) 0.93%
Υγρό Γαλακτωματοποίησης (EC)
Εγγ.σύνθεση: milbemectin 0,93 % β/ο **Αριθμ. Εγκρ. Κυκλ.:** 2181/31-01-2011
βοηθ.ουσίες: 98,95 % β/β

Η δραστική του ουσία milbemectin είναι μίγμα δύο προϊόντων ζύμωσης του βακτηρίου Streptomyces. Είναι ακαρεοκτόνο και εντομοκτόνο. Το προϊόν δρα δι' επαφής και από στομάχιου. Η βιοχημική του δράση εντοπίζεται στο περιφερειακό νευρικό σύστημα των στόχων προκαλώντας παράλυση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΧΙ
ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ
Εύφλεκτο
Ερεθίζει τα αναπνευστικά συστήματα
Επιδράσεις μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
Η εσπονή σπινν μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

N
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλον.

Περιεχόμενο 25 κ.εκ.

Κάτοχος της έγκρισης: Sumi Agro Europe Limited, Vintners' Place 68 Upper Thames Street, London EC4V 3 B
Παρασκευαστής σκευάσματος: Mitsui Chemicals Agro, Inc., Ispania Εργαστήριο παρασκευής: Usunomiyama Works, Ispania
Υπεύθυνος για την τελική και σήμανση Εργαστήριο Σκουκισμός :
κελλαφορμ-ε
Αθήνα: Θέμης 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ.ΝΙΚΗ: Τηλ. Θηβών 1203, Bl.Π.Ε.Θ. 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Σουλιά Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.08-9 e-mail: info@hellam.gr

MILBEKNOCK^{1EC}

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ : Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. - Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. - Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό - Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια - Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
Σε περίπτωση κατάποσης: Να μην προκληθεί εμετός: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ρίξτε αμέσως και επί μερικά λεπτά άφθονο νερό. Αν παρουσιαστεί ερεθισμός και επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως τα εμποτισμένα με ψεκαστικό υγρό ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με σαπουνί και άφθονο νερό. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν ο ερεθισμός παραμένει. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε αμέσως τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν η αναπνοή γίνεται με δυσκολία ζητήστε ιατρική βοήθεια. **Σημείωση για το γιατρό:** Το προϊόν περιέχει παράγωγα πετρελαία. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77.93.777**

Το υλικό αυτό και ο περιεχόμενος του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικινδύνους αποβλήτα. Αποφύγετε την απελευθέρωση του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
Κατά τη διάρκεια των ψεκασμών οι κυψέλες να είναι κλειστές για μία ημέρα λυμβανόντας μέγιστα για παροή νερού και τροφής. ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μισή αφέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τα **μηλοειδή** και **20 μέτρων** για τα **εσπεριδοειδή**
Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη **10 μέτρων** από **μη γεωργική** γη για τα **εσπεριδοειδή**.
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικίνδυνους μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιεργίες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.