

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. • Φοράτε μπότες, ολόσωμη φόρμα, γάντια, καπέλο και κατάλληλη προστατευτική μάσκα κατά την ανάμιξη / φόρτωση και τον ψεκασμό. • Μην αυξάνετε τις δόσεις.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Εισπνοή: Μεταφέρατε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε τις περιοχές του δέρματος στις οποίες έπεσε σκευάσμα ή ψεκαστικό υγρό με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκευάσμα. Πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε. Μην παίρνετε για πλύσιμο τον ρουχισμό στο σπίτι.

Σε περίπτωση κατάποσης: Δώστε στον παθόντα 2 ποτήρια νερό και συμβουλευθείτε γιατρό. Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Σημείωση για το γιατρό: Σε περίπτωση κατάποσης συνιστάται προσεκτική πλύση στομάχου.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες /το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερομηνία παρασκευής:

Αριθμός παρτίδας:

Βλέπε φιάλη

MIMIC 24 SC

tebufenozide (χημική ομάδα: διακυλ-υδραζίνες)

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη Σύνθεση: tebufenozide 24% β/ο
βοηθ. ουσίες 76,9% β/β

Εντομοκτόνο
-μιμητικό της ορμόνης αλλαγής περιβλήματος
των προνυμφών των λεπιδοπτερών-

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρισης Κυκλ.: 1796/ 22-01-2004

Περιεχόμενο: **600 κ.εκ.**

Κάτοχος της έγκρισης: Nisso Chemical Europe GmbH, Γερμανία
Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Joh. Kwizda BmbH, Αυστρία
Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά - Εργοστάσιο συσκευασίας:

 **Κ.Β.ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ & ΟΙ ΟΙ**

ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΗΛ: 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@eftymiadis.gr

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το tebufenozide είναι ρυθμιστής ανάπτυξης των εντόμων και μιμείται τη δράση της εκδυσόνης, μιας ορμόνης αλλαγής του περιβλήματος των προνυμφών των λεπιδοπτερών. Προκαλεί την πρόωπη αλλαγή του περιβλήματος των προνυμφών με αποτέλεσμα το θάνατό τους μέσα σε 2-4 ημέρες. Δεν είναι διασυστηματικό και δρα κυρίως με κατάποση, ενώ έχει ελάχιστη δράση με επαφή. Είναι δραστικό κυρίως στις προνύμφες, λιγότερο στα ώα, ενώ δεν έχει δράση στα ακμια.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ: για **Φυλλοκνίστη** (*Phyllocnistis citrella*) στη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος / λάδι / 100 λίτρα ψεκ. υγρού με 100-250 λίτρα ψεκαστικού υγρού/ στρέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη προσβολής (προνύμφες, στα πρώτα στάδια). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών /καλλιεργητική περίοδο: 2 ανά 14 ημέρες.

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ: για **Καρποκάφα** (*Cydia pomonella*), **Φυλλορύκτες** (*Phyllonorycter* spp) στη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού με 100-150 λίτρα ψεκαστικού υγρού/ στρέμμα. Εφαρμογές από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 81, Αύγουστος). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών /καλλιεργητική περίοδο: 4 ανά 14-21 ημέρες.

ΑΜΠΕΛΙ: για **Ευδερίδα** (*Lobesia-Polychrosis botrana*) στη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού με 50-100 λίτρα ψεκαστικού υγρού/ στρέμμα. Εφαρμογές από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 81, Ιούλιος-Αύγουστος). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών /καλλιεργητική περίοδο: 2 ανά 7 ημέρες.

ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ (Θερμοκηπίου): για **Σποντόπτερα** (*Spontoptera* spp) στη δόση 60-80 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού με 100-150 λίτρα ψεκαστικού υγρού/ στρέμμα. Εφαρμογές από την έναρξη της προσβολής (προνύμφες, στα πρώτα στάδια). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών /καλλιεργητική περίοδο: 3 ανά 7-14 ημέρες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Ο προσδιορισμός του χρόνου εφαρμογής γίνεται με σύστημα φερομονικών παγίδων για παρακολούθηση των πτήσεων των γενεών ή σύμφωνα με τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση. Ξεπλύνετε τις κενές φιάλες συσκευασίας, ρίχνοντας τα νερά στο ψεκαστικό δοχείο.

Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης. Για την καταπολέμηση του φυλλοκνίστη των εσπεριδοειδών συνιστάται ο συνδυασμός με 300-500 κ.εκ. γαλακτώματος ορυκτελαίου (π.χ. θερινός καλός). Να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται και στην ετικέτα του ορυκτελαίου.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Ξεπλuma με άφθονο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλuma (τα νερά στο ξεπλuma στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Το σκευάσμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

- Μανταρινιά, Μηλιά, Αχλαδιά: 14 ημέρες

- Αμπέλι: 21 ημέρες

- Τομάτα, Πιπεριά (θερμοκηπίου): 3 ημέρες



1013