

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα**, αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάποσης**, **να μην προκληθεί έμετος**. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό, μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. **Αντίδοτο**: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες, το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: βλέπε επί της συσκευασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 600 κ.εκ.



Miraculix®

45EC

Prochloraz (Προχλωράζ) 45%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό

Εγγυημένη σύνθεση: **Prochloraz 45% β/ο**

Βοηθητικές ουσίες: 58,94% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. φ.: 60234/23.12.2008

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

Κάτοχος της έγκρισης:
Makhteshim Agan Holding B.V., Ολλανδία
Υπεύθυνος για την διάθεση του σκευάσματος στην Ελληνική αγορά:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 211205555, φαξ: 211205559
Θεσ/νικ: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωλνία
Τηλ.: 2310784931-6, φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βιοωτίας

ΜΙΡΑΚΟΥΛΙΞ: Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: α) Εσπεριδοειδή: Εμβάπτιση των καρπών για 25-30 δευτερόλεπτα ή ψεκασμός τους κατά τη συσκευασία. β) Πυρηνόκαρπα-Αμυγδαλιά-Τριανταφυλλιά-Σιτάρι-Κριθάρι: Ψεκασμός φυλλώματος. γ) Μανιτάρια: Ψεκασμός του υποστρώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 1) Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. 2) Στην περίπτωση της ενσωμάτωσης με υδατοδιαλυτούς κηρούς, συνιστάται να γίνεται πρώτα ανάμειξη ενός μέρους σκευάσματος (**Miraculix® 45EC**), με 10 μέρη νερό και ανάδευσή μέχρι να γίνει γαλακτώμα. Το γαλακτώμα προστίθεται στο διάλυμα κηρού και αναδεύεται για 15 λεπτά τουλάχιστον στις 1500 στροφές ανά λεπτό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα νερό)-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΚΑΡΠΟΙ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (Γκρέιπ φρουτ-Κίτρα-Λεμόνια-Μανταρίνια-Νεράντζια-Πορτοκάλια-Φράπες): Σίψις από *Penicillium digitatum* και *Penicillium italicum*. Δόση: 105-210 ή 420-630 κ.εκ./100 λίτρα διαλύματος υδατοδιαλυτού κηρού. Εφαρμογή μεταοδηκτική κατά τη συσκευασία. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδάκινα-Βερικοκιά-Κερασιά-Δαμασκηνιά-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ:** Φιά οήψη. Δόση: 60. Εφαρμογή α) 1-2% της άνθησης, β) στην πλήρη άνθηση, γ) στην πτώση των πετάλων. **ΚΑΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:** Ξηρή οήψη, Υγρή οήψη, Αραχνειοειδής ιστός. Δόση: 3 κ.εκ./τετρ. μέτρο. Εφαρμογή 5-7 ημέρες μετά την επικάλυψη. **ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι-Κριθάρι):** Ωίδιο, Στεπρίωση, Φουζαρίωση, Παρασιτικό ηθάγιασμα, Εθμινθοσπορίωση, Ρυχθοσπορίωση. Δόση: 65-105. Ψεκασμός φυλλώματος μετά το τέλος του αεθμώματος και εφόσον εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα ασθενειών. **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ:** Ωίδιο, Μελανή κηλίωση φύλλων, Τεφρά οήψη. Δόση: 50-100. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη εφόσον υπάρχει πρόβλημα ανά 10-14 ημέρες.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Πυρηνόκαρπα-Αμυγδαλιά (150), Καλλιεργούμενα Μανιτάρια (1-2 λίτρα ψεκ. υγρού/τετρ. μέτρο), Σιτάρι (20-40), Τριανταφυλλιά (50-80).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καθιεργητική περίοδος: Πυρηνόκαρπα-Αμυγδαλιά (3), Καρποί εσπεριδοειδών-Καλλιεργούμενα Μανιτάρια-Σιτάρι (1).

Παρατηρήσεις: • Οι μικρές δόσεις αφορούν σε προληπτικές εφαρμογές και οι μεγάλες σε θεραπευτικές. • Μην ψεκάζετε αν πρόκειται να βρέξει μέσα στις επόμενες 3 ώρες. • Η διάρκεια δράσης του είναι 4-6 εβδομάδες. • Στις καλλιέργειες των πυρηνόκάρπων και στην αμυγδαλιά, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες τους.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Ροδάκινα-Βερικοκιά-Κερασιά-Δαμασκηνιά-Αμυγδαλιά: Πτώση πετάλων.
Καλλιεργούμενα Μανιτάρια: 10 ημέρες
Σιτάρι-Κριθάρι: 56 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις υπό τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Σε ορισμένα είδη μανιταριών μπορεί να παρατηρηθούν κάποιον κακοσχηματισμό ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη, χωρίς αυτό να επηρεάζει την τελική απόδοσή..

Μέρος του

