

• Διατηρήστε την αρχική συσκευασία ερμητικά κλεισμένη. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό.

Ανά ανανθή: Απομαρτύνει τον ασθενή από το χώρο που εκτέθηκε και κρατάει τον να αναπαυθεί σε ζεστό χώρο. Ενημερώνει το γιατρό προληπτικά. **Σε περιττώση επαφής με το δέρμα,** αφαιρείται αμέσως τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και ξεπλύνει τα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα, συμπεριλαμβανομένων τα μαλλιά και τα νύχια, με νερό και σαπούνι. Αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση του δέρματος. Τα βερνικωμένα ρούχα θα πρέπει να πλυθούν πριν ξαναφορεθούν. **Σε περιττώση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνει αμέσως με άφθονο νερό ή ειδικό διάλυμα για τα μάτια, κρατώντας ανοικτά τα βλεφάρα τουλάχιστον για 5 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περιττώση κατάποσης,** ζητήστε αμέσως συμβουλή γιατρού και δείξτε του το δοχεί ή την ετικέτα. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του, ξεπλύνει του το στόμα με νερό. Μην του προκαλέσετε εμετό. **Περίεργη θεραπευτική αγωγή-Αντίδοτο:** Συμμετακινήστε και υποστηρικτική αγωγή, όπως ενδοκέντρα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

N



ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

1) Για την εμφάνισή τους σε νεαρά φυτά ταύρις, την περίοδο 3-5 εβδομάδες από τη μεταφύτευσή ή 5 εβδομάδες από τη σπορά. 2) Για την χρησιμοποίησή σε καλλιέργεια ταύρις από κόλπην, στην επικρατούσα συνθήκη υπερβολικά υψηλής σχετικής υγρασίας στην επιφάνεια των φυλλών για περισσότερες από 2-3 ώρες ή/και υψηλότερο θερμο-²⁵ 25°C είναι φυσιολογικό στις μηλιές. Την χρησιμοποίησή το **Mirador[®] 255C** για εφαρμογές εναντίον του ψεκαστικού νέφους να φθάσει σε γεωγραφικά καλλιέργεια μηλιές. 4) Ψεκαστικό μέσα εφαρμογής με το **Mirador[®] 255C**, να ξεπλύνονται με ιδιαίτερη προσοχή την χρησιμο-
ποίηση.

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριηθό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκάστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα ή σχίσσιμο, για τη διασφάλιση της μη

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλή αερισζόμενο, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Σε αυτές τις συνθήκες, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.



02/2013-7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την
τελική συσκευασία και σήμανση:

Syngenta Hellas AEBE - Ανθούσα Αττικής
Τηλ.: 2106666612-13

Συσκευιαστής-Λιανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ : 2111205555 Φαξ: 2111205559

Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάννης

Трѡ : 2310784931-6 факс: 2310780453

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΥΔΕΚ)

Mirador® 25SC

Azoxystrobin (Αζοξυστρομπίν) 25%
Πυκνό εναιώρημα

Εγγυημένη σύνθεση: **Azoxystrobin** 25% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 76,2% β/β

Αρ.Εγκρ.Κυκλφοφ.: 60331/07.08.2012

**Μικροτοκτόνο με προστατευτική,
θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση
για το ωΐδιο, τον περονόσπορο, την
αθερνάρια, τη σκωρίαση, το στεμφύλιο
και την κερκόσπορα.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαννηλματίες χρήστες

MIPANTOP: Το **Mirador® 25SC** είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση για το κίτσιο, τον περονόσπορο, την αθερνάρια, τη σκωρίαση, το στεμφύλιο και την κερκόσπορα. Περιέχει το δραστικό συστατικό azoxystrobin.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Τα κενά συσκευασίας, ζητήστε να το πωλήσει φορές, ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΑΓΥΡΙΟ (*υαλβάρη* & *βερκυμπίο*): Σβίο: δόσι: 60-80 κ.γ./100 λίτρα υψ. υπέρ 164 κ.ε/στ. (Α), 120 κ.ε/στ. (Β). Περίσπορος: δόσι: 80-100 κ.γ./100 λίτρα υψ. υπέρ 80 κ.ε/στ. (Α), 150 κ.ε/στ. (Β). Χειμάκι φυλλώματος ποφιστικά ή με την εμφάνιση των πρώτων σπυμμάτων. **ΠΕΤΙΟΝ (*υαλβάρη* & *βερκυμπίο*):** Σβίο: δόσι: 80 κ.ε/στ. Περίσπορος: δόσι: 80-100 κ.γ./100 λίτρα υψ. υπέρ 80 κ.ε/στ. (Α), 150 κ.ε/στ. (Β).

ΒΕΡΚΥΜΠΙΟ: Σβίο: δόσι: 80-100 κ.γ./100 λίτρα υψ. υπέρ 80 κ.ε/στ. (Α), 120 κ.ε/στ. (Β). Περίσπορος: ΑΓΓΕΛΩΝ: δόσι: 80-100 κ.γ./100 λίτρα υψ. υπέρ 100 κ.ε/στ. (Α), 150 κ.ε/στ. (Β). Χειμάκι φυλλώματος ποφιστικά ή με την εμφάνιση των πρώτων σπυμμάτων. **ΚΟΚΚΥΘΗ (*υαλβάρη* & *βερκυμπίο*):** Σβίο: δόσι: 60-80 κ.ε/στ. Χειμάκι φυλλώματος ποφιστικά ή με την εμφάνιση των πρώτων σπυμμάτων. **ΠΙΠΕΡΙΑ (*υαλβάρη* & *βερκυμπίο*):** Σβίο: δόσι: 80 κ.ε/στ. Χειμάκι φυλλώματος ποφιστικά ή με την εμφάνιση των πρώτων σπυμμάτων. **ΑΓΙΝΑΡΑ:** Σβίο: δόσι: 80 κ.ε/στ. Χειμάκι φυλλώματος ποφιστικά ή με την εμφάνιση των πρώτων σπυμμάτων. **ΑΓΙΝΑΡΑ:** Σβίο: δόσι: 80 κ.ε/στ. Χειμάκι φυλλώματος ποφιστικά ή με την εμφάνιση των πρώτων σπυμμάτων. **ΚΑΡΠΟΣ:** δόσι: ΑΓΓΕΛΩΝ: δόσι: 80-100 κ.γ./100 λίτρα υψ. υπέρ 80 κ.ε/στ. (Α), 150 κ.ε/στ. (Β). Χειμάκι φυλλώματος ποφιστικά ή με την εμφάνιση των πρώτων σπυμμάτων. **ΣΚΟΡΔΑ:** δόσι: 80-100 κ.γ./100 λίτρα υψ. υπέρ 80 κ.ε/στ. (Α), 150 κ.ε/στ. (Β). Χειμάκι φυλλώματος ποφιστικά ή με την εμφάνιση των πρώτων σπυμμάτων. **ΦΑΡΜΑΚΙΑ:** δόσι: 80-100 κ.γ./100 λίτρα υψ. υπέρ 80 κ.ε/στ. (Α), 150 κ.ε/στ. (Β). Χειμάκι φυλλώματος ποφιστικά ή με την εμφάνιση των πρώτων σπυμμάτων. **ΣΤΙΓΜΑΡΙ:** Ξωπόγειο: δόσι: 80-100 κ.γ./100 λίτρα υψ. υπέρ 80 κ.ε/στ. Χειμάκι φυλλώματος ποφιστικά ή με την εμφάνιση των πρώτων σπυμμάτων. **ΖΑΧΑΡΟΚΑΡΠΑ:** δόσι: 80-100 κ.γ./100 λίτρα υψ. υπέρ 80 κ.ε/στ. Χειμάκι φυλλώματος ποφιστικά ή με την εμφάνιση των πρώτων σπυμμάτων. **ΠΥΞΙ:** Πικρική ορυζας. Δόσι: 100 κ.ε/στ. Χειμάκις φυλλώματος. Η εραρρύθμι προηγούμενη από στάδιο του φουσκώματος του κολλήει μέχρι το τέλος του ξεστακώματος. **ΣΤΙΠΤΑ:** Septoria tritici. Puccinia recondita. δόσι: 80-100 κ.ε/στ. Χειμάκις φυλλώματος ποφιστικά ή με την εμφάνιση των πρώτων σπυμμάτων ΙΒΒΧ 99-ΒΒΒH 69). **ΕΛΑΙΟ:** δόσι: 80-100 κ.γ./100 λίτρα υψ. υπέρ 80 κ.ε/στ. Χειμάκις φυλλώματος ποφιστικά ή με την εμφάνιση των πρώτων σπυμμάτων. **ΦΑΙΟΛΑ:** Uromyces sp. Δόσι: 80-100 κ.ε/στ. Χειμάκις φυλλώματος ποφιστικά ή με την εμφάνιση των πρώτων σπυμμάτων. **ΜΥΡΜΕΚΕΣ:** Uromyces sp., Ascochyta sp. Δόσι: 80-100 κ.ε/στ. Χειμάκις φυλλώματος ποφιστικά ή με την εμφάνιση των πρώτων σπυμμάτων. **ΜΥΡΜΕΚΟΛΟ:** Peronospora parasitica. Δόσι: 80-100 κ.ε/στ. Χειμάκις φυλλώματος ποφιστικά ή με την εμφάνιση των πρώτων σπυμμάτων. **ΜΥΡΜΕΚΟΛΟ:** Peronospora parasitica. Δόσι: 80-100 κ.ε/στ. Χειμάκις φυλλώματος ποφιστικά ή με την εμφάνιση των πρώτων σπυμμάτων.

Όγκος ψευκαστικού υγρού (ή/και στρέμμα): Αγγούρι (Α: 50-80, Θ: 50-150), Πεπόνι-Πιπεριά-Σπαράγγι-Μηρόκοιλο-Κουνουπίδι (50-100), Τομάτα (Α: 50-100, Θ: 50-150), Κολοκύθη-Φράουλα (50-80), Καρπούζι-Αγγινάρα (100), Κρεμμύδι-Σκόρδο (40-50), Ζαχαρό-τευτλη (40), Ρύζι (20-40), Σιτάρι-Ελλαιοκούρνη (20-30), Φασόλι-Μπιζέλι-Καρότο (30).

Μέγιστος αριθμός εμφανιζόμενων καθημερινών περιόδων-Μεσοοιστήματα: Αγγούρι & Πεπόνι (3 / Για ώλιμο: 7-10 ημέρες, Για Περινόσπορο: 5-7 ημέρες), Ταμάτο-Κολοκύθα-Καρότο-Πιπερί (3 / 7-10 ημέρες), Αγγινάρα (3 / 7 ημέρες), Καρότο (3 / 10-14 ημέρες), Κρεμμύδι (3 / 6-8 ημέρες), Χορδο (3 / 14 ημέρες), Φρούσια (3 / 7-12 ημέρες), Σπαράγγι (3 / 10-20 ημέρες), Ζαχαρότευπλο (2 / 21 ημέρες), Ροζολί (1), Στάρι (ψέκρη 2 / 10-14 ημέρες), Ελασιόκρυμνη (ψέκρη 2 / 21 ημέρες), Φασόλι-Μπιζέλι (ψέκρη 2 / 14 ημέρες), Μπρόκολο-Κουνούδι (ψέκρη 2 / 12 ημέρες).

Παρατηρήσεις:

[illegible]

Τελευταία επένδυση πριν τη συγκομιδή:

Αγγούρι, Πεπόνι, Τομάτα, Κολοκύθι, Καρπούζι, Πιπεριά, Φράουλα: **3 ημέρες**. Αγγινάρα: **7 ημέρες**. Καρότο: **10 ημέρες**. Κρεμμύδι, Σκόρδο, Φασόλι, Μπιζέλι, Μπρόκολο, Κουνουπίδι: **14 ημέρες**. Ελαιοκράμβη: **21 ημέρες**. Ρύζι: **28 ημέρες**. Ζαχαρότευτλα: **30 ημέρες**. Σπύρι: **35 ημέρες**.

ΔΙΑΠΕΡΙΣΤΡΑΦΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ: Μέγιστος αριθμός ελασμάτων 2-5 ανά καθημερινή περίοδο, ανάλογα με τις καθημερινές.
 • Αντιρροπές τις συνεκτικές διαρροές με **Mirador® 255C**. Να γίνεται μία εφαρμογή με **Mirador® 255C** κάθε 3 επεμβάσεις.
 • Μετά τον ψεκασμό με **Mirador® 255C** να ακολουθούν επεμβάσεις με μυκητοκτόνα διασπορετικά τρόποι δράσης. Για παράδειγμα, evaluation **Mirador® 255C** να τα μυκητοκτόνα που έχουν ανά δράσητική ομάδα τα kresoxim methyl, famoxadone, fenamidone, picotystrobin, pyraclostrobin, trifloxystrobin, fluoxastrobin, metominostrobin, oryzastralin, dimoxystrobin και enastrombrin δεν εντοπίζονται. Οι evaluations συνδυάζονται με την ίδια σειρά και στις ακολουθούμενες καλλιεργείες.