

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάποσης,** να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό, μεταφέρατε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ανατίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



03/2012-9



Κάτοχος της έγκρισης-Διανομείας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσα/νικη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Μέλος του



Mirage® 45EC

Prochloraz (Προχλωράζ) 45%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό

Εγγυημένη σύνθεση: **Prochloraz** 45% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 57,21% β/β

Αρ. Έγκρ.Κυκλοφ.: 6595/06.10.1993

**Μυκητοκτόνο με προστατευτική
και θεραπευτική δράση**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
ΕΥΦΛΕΚΤΟ

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

ΜΙΡΑΖ:

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- 1) Επεριδοειδή: Εμβάπτιση των καρπών για 25-30 δευτερόλεπτα ή ψεκασμός τους κατά τη συσκευασία.
- 2) Σιτάρι-Κριθάρι: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

- 1) Η κατάλληλη δόση του σκευάσματος προστίθεται σε επαρκή ποσότητα νερού, αναδεύεται καλά και συμπληρώνεται με το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.
- 2) Στην περίπτωση ενσωμάτωσης σε υδατοδιαλυτούς κηρούς, συνιστάται να γίνεται πρώτα ανάμειξη ενός μέρους σκευάσματος **Mirage® 45EC** με 10 μέρη νερό και ανάδευση μέχρι να γίνει γαλάκτωμα. Το γαλάκτωμα αυτό προστίθεται στο διάλυμα κηρού και αναδεύεται για 15 λεπτά τουλάχιστον στις 1500 στροφές ανά λεπτό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΚΑΡΠΟΙ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (Γκρέιπ-φρουτ-Κίτρα-Λεμόνια-Μανταρίνια-Νεράντζια-Πορτοκάρφια-Φράπες): Σήψεις από *Penicillium digitatum*, *Penicillium italicum*. Δόση: 105-210 κ.εκ./100 λίτρα νερό ή 420-630 κ.εκ./100 λίτρα διαλύματος υδατοδιαλυτού κηρού. Εφαρμογή μετασυλλεκτικά κατά τη συσκευασία. **ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι-Κριθάρι)**: Ωίδιο, Σεπτορίωση, Φουζαριώση, Παρασπικό πρήσιασμα, Ελμινθοσπορίωση, Ρυχχοσπορίωση. Δόση: **65-105 κ.εκ./100 λίτρα νερό**. Ψεκασμός φυλλώματος μετά το τέλος του αδειώματος και εφόσον εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα των ασθενειών.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: Σιτάρι, Κριθάρι (20-40 λίτρα/στρέμμα).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καθιερωτική περίοδος:
Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:

- α) Οι μικρές δόσεις αφορούν προληπτικές εφαρμογές και οι μεγάλες θεραπευτικές. β) Μην ψεκάζετε αν πρόκειται να βρέξει μέσα στις επόμενες 3 ώρες. γ) Η διάρκεια δράσης του είναι 4-6 εβδομάδες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Σιτάρι-Κριθάρι: **56 ημέρες**.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις υπό τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.