

ΜΙΣΤΡΑΛ 70WG:
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και ημιαυψυλλών ζιζανίων σε καλλιέργειες πατάτας, τομάτας, μηδικής, σόγιας, καρότου και σπαραγγιού.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Το **Mistral® 70WG** εφαρμόζεται πριν ή μετά το φύτευμα τόσο των καλλιιεργειών όσο και των ζιζανίων. Πριν την εφαρμογή του, προετοιμάστε καλά το χωράφι, ώστε να είναι ψηφοχωματισμένο. Η συνιστώμενη κατά περίπτωση δοσολογία εφαρμόζεται με 20-50 λίτρα νερού/στρέμμα. Οι διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες (αυλάκωμα, παράκωμα, κ.λπ.) πρέπει να γίνονται πριν την εφαρμογή του προϊόντος. Η ύπαρξη αρκετής υγρασίας στο έδαφος κατά την εφαρμογή του ευνοεί τη δράση του σκευάσματος. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm.). Χρησιμοποιήστε μπεκ τύπου σκούπας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το 1/3-1/2 του απαιτούμενου νερού. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε την προδilυση του φαρμάκου στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΚΑΡΟΤΟ: Ετήσια ημιαυψύλλια και αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: **50 γρ./στρ. Μεταφυτωτικά:** Εφαρμογή όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 4 φύλλων. **ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:** Ετήσια ημιαυψύλλια και αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: **40 γρ./στρ. α) Προφυτωτικά:** Εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά μέχρι το κέντρωμα των σπέρων, ή **β) Μεταφυτωτικά:** Εφαρμογή στο στάδιο των 2-4 πραγματικών φύλλων, μετά από αυλάκωμα ή το σχηματισμό «ραπезιών» ή σε **Μεταφυτεύσιμην τουτότα:** Εφαρμογή 20 ημέρες μετά τη μεταφύτευση και όταν τα φυτά έχουν «ριζοποιήσει» και έχουν 3-4 πραγματικά φύλλα. Όταν εφαρμόζεται στα σπυρδία και στα αυλάκια, η δοσολογία μειώνεται ανάλογα με την ψεκαζόμενη επιφάνεια. **ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ:** Ετήσια ημιαυψύλλια και αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: **50-100 γρ./στρ.** Εφαρμογή πριν το φύτευμα της καλλιέργειας. **ΣΟΓΙΑ:** Ετήσια ημιαυψύλλια και αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: **75-100 γρ./στρ. Προφυτωτικά:** Εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά. **ΠΑΤΑΤΕΣ:** Ετήσια ημιαυψύλλια και αγρωστώδη ζιζάνια. **α) Προφυτωτικά:** Δόση: **50-100 γρ./στρ.** Εφαρμογή από το φύτεμα μέχρι 3-4 ημέρες πριν το φύτευμα της καλλιέργειας, ή **β) Μεταφυτωτικά:** Δόση: **50 γρ./στρ.** Εφαρμογή από την εμφάνιση των νεαρών βλαστών πατάτας έως το διάστημα που τα φυτά θα αποκτήσουν ύψος 5-10 εκ. ή **γ) Προφυτωτικά + Μεταφυτωτικά:** Δόση: **50 + 50 γρ./στρ.** 1η εφαρμογή λίγο πριν το φύτευμα της πατάτας και 2η εφαρμογή όταν τα φυτά αποκτήσουν ύψος 5-10 εκ. **ΜΗΔΙΚΗ:** Ετήσια ημιαυψύλλια και αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: **75-100 γρ./στρ.** Εφαρμογή το χειμώνα στην περίοδο θηράργου της καλλιέργειας.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-50 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:
1) Οι δόσεις είναι ανάλογα με το είδος του εδάφους. Οι χαμηλές δόσεις στα ελαφρά εδάφη, οι υψηλές δόσεις στα βαρεια εδάφη. **2)** Η **προφυτωτική** εφαρμογή στην Πατάτα συνιστάται στις ποικιλίες: Atica, Apollo, Arran-Banner, Fina, Kennebek, Claustar, Maryke, Ostara, Sebago, Spuda, Agria, Hermes, Hertha, Minerva, Nicola, Ovetik. Ειδικά για τις ποικιλίες Colanto, & Jaeria, οι δοσολογίες είναι: 50-75 γρ./στρ. σε βαρεια ή μέσης υδατότητας εδάφη και 50 γρ./στρ. σε ελαφριά εδάφη. **3)** Η **μεταφυτωτική** εφαρμογή στην Πατάτα συνιστάται στις ποικιλίες: Arran-Banner, Kennebek, Claustar, Sebago, Spuda, Martona, Blanc, Ausonia, Enzita, Arcula, Concurrent, Hermes, Crista, Mondial, Timate. **4)** Η εφαρμογή του σκευάσματος στην Τομάτα, Inproφυτωτικά-μεταφυτωτικά, συνιστάται στις ποικιλίες: Roma V.F., Super Roma, Super California, Roma Nova, Ventura, Napoli V.F., Red River, CAL J. Campbell 33, Perilita, Petomek, Heirtz 1706, AT 70/14, TOKO-70, ES 58, VF 65, VF 198, Euromack, ACE-55, Early Pack-7. Στην ποικιλία Fantastic, η εφαρμογή γίνεται μόνο στα αυλάκια, χωρίς να βρέχονται τα τομάτφυτα. Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιείται και στις υπόλοιπες ποικιλίες τομάτας σε δοσολογία 30 γρ./στρ. και με εφαρμογή μόνο με ψεκαστικό με μπάρα ή ψεκαστήρα ημίτης και μπεκ τύπου σκούπας. **5)** Στις ευρωπαϊκές ποικιλίες Σόγιας πρέπει να γίνει δοκιμή ανεκτικότητας των φυτών σε μικρή κλίμακα.

Καταπολιεμούμενα ζιζάνια:
Βλήητα, Λουβουδιά, Λαψάνα, Ζωχός, Αντράκλια, Περίδοκωή, Άνθεις, Τάτοωλια, Λάμιο, Καπνόχορτο, Κενταύριο, Χαμομήλι, Σκαρολάχανο, Οξάλις, Παπαρούνα, Ποηικόμυη, Μαρτίκος, Αγριοσινάπι, Σπουνόχορτο, Αγριοραδίκι, Τσοκνίδα, Βερνίκη, Πικραλίδα ή Χοιροβότανο, Αλεποουρά, Αιματόχορτο, Μουχρίσσα, Ήρα, Πόα, Σετάρια, Σκυλήχορτο, Ελεοσίνα, Αγκάδι, Σκυλάκι, Αγριοκαρόδα-μούδα, Βραχιάρα, Κομηλίνα.

Ανθεκτικά ζιζάνια:
Αγριοβρώμη, Κίραιο, Μεγάλη κολλήητοίδα, Μολόχα, Στύφνος ή αγριοτοματίδα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην ίδια περίοδο μπορεί να καλλιεργηθεί, μετά από άρωμα του χωραφιού, πατάτα, τομάτα ή καθαρήκη.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 60 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις καλλιέργειες και ποικιλίες που αναφέρονται στην ετικέτα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Το σκεύασμα εφαρμόζεται μόνο του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Οι σακούλλες μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλη σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Αποθηκεύεται στην αρχική του απαράβιαστη συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες κάτω των 35°C. Σε αυτές τις συνθήκες, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
Βρίηε επί της συσκευασίας.

Mistral®

70WG

Metribuzin (Μετρίμπουζίν) 70%
Βρέξιμοι κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση: **Metribuzin** 70% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 24,73% β/β
Αρ. Έγκρ.Κυκλφ.: 7580/12.07.1999

Εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και ημιαυψυλλών ζιζανίων

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η εφαρμογή του στα θερμοκήπια
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

 Παρασκευαστής:
Feinchemie Schwabda GmbH - Γερμανία

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Συσκευαστής-Διανομέας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559
Θεσσ/vikn: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
●Φυλίδετε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ●Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. ●Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. ●Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβήκημα για ν' αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΟΤΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ:
●Φυλίδετε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα και λιπάσματα. ●Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. ●Αποφύγετε τη χρήση του σε αμυώδη εδάφη, σε εδάφη με περιεκτικότητα οργανικής ουσίας μεγαλύτερη από 6%. ●Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γεωτεχνικές ευαίσθητες καλλιέργειες. ●Αν ρυπαθούν τα νερά άρδευσης να μη χρησιμοποιηθούν. ●Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. ●Μη διηποψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξανετε τις δόσεις. ●Μετά τον ψεκασμό, ξεπλύντε ποτήρες το ψεκαστικό μέσα με άφθονο νερό. ●Κατά τους θερμινούς μήνες αποφεύγετε να ψεκάζετε τις ζεστές ώρες της ημέρας.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 100 γρ.
 03/2011-6