

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: •Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. •Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. •Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. •Αποφύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση •Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. •Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας. •Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

(Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης)

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). Μην χορηγείτε υγρό και μην προκαλείτε εμετό εάν ο πάσχον δεν διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς.
Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε βοήθεια γιατρού ο οποίος θα αποφασίσει το αν θα προκληθεί εμετός ή όχι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα πολύ καλά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα για αρκετά λεπτά ακόμη. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα συμβουλευτείτε γιατρό, κατά προτίμηση οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε πολύ καλά κάτω από τρεχούμενο νερό και χρησιμοποιείστε σαπούνι. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
Σε περίπτωση εισπνοής μετακινήθείτε στον καθαρό αέρα, συμβουλευτείτε γιατρό.
Για το γιατρό: Το προϊόν περιέχει έναν διαλύτη και έναν αναστάλαε της χολινεστεράσης. Προτείνεται η χορήγηση ενέσιμης ατροπίνης ως αντίδοτο. Οι οξίμες όπως το 2-PA M/propofol μπορεί να έχουν θεραπευτική δράση εάν χρησιμοποιηθούν νωρίς, σε κάθε περίπτωση όμως σε συνδυασμό με ατροπίνη. Προτείνεται ενδοτραχειακός και/ή εισαφραγκός έλεγχος εάν έγινε πλύση στομάχου. Θεραπεία συμπτωματική. Η θεραπεία θα βασιστεί στην κρίση του γιατρού σε σχέση με τα συμπτώματα του ασθενούς.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
Μη ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για τουλάχιστον 21 ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής: •Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος μέχρι απορροής. •Ψεκασμοί εδάφους και ενσωμάτωση. •Δολώματα.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτερωv χρήσης εναποτιθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν επιτρέπεται η χρήση του σε πρώιμες ποικιλίες ροδακινιάς γιατί μπορεί να εμφανιστεί φυτοτοξικότητα. Επίσης είναι φυτοτοξικό στην ποικιλία αχλαδιών κρυστάλλια.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή: 30 ημέρες, Λοιπές καλλιέργειες: 20 ημέρες

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία, μακριά από το άμεσο ηλιακό φώς, τις ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, φάρμακα, καλλυντικά και λιπάσματα. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για **3 χρόνια**

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
Βλέπε φύλλο

Μόριγκαν

MORRIGAN 48EC

Εντομοκτόνο

T

ΤΟΞΙΚΟ

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υγρό Γαλακτωματοποίησης (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Chlorpyrifos: 48.0% β/Ο
Βοηθητικές ουσίες: 52.3% β/β

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση
μασητικών και μυζητικών εντόμων.

Το chlorpyrifos ανήκει στην ομάδα των
οργανοφωσφορικών και δρά αναστέλοντας τη δράση
της ακετυλ-χολινεστεράσης.

•Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
•Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
•Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 1639/27-09-1993

Κάτοχος της Έγκρισης - Παρασκευαστής- Υπεύθυνος
για την τελική συσκευασία και σημάνση:

YPSILON Α.Ε.
Δ. Γληνού 32, 542 49, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:2310-334 377 Fax:2310-334 378
E-mail: administration@ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΦΥΛΛΟΜΑΤΟΣ:

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά: -Ανάρσια (*Anarsia lineatella*)-Βαμβοκάδα (*Diaspis pentagona*) -Καρπόκαψα (*Cydia malesta*) -Φυλλοδέτες (*Achips rosana*, *A. podanus*, *Adoxophyes orana*) -Ζευζέρα (*Zeuzera pyrina*) -Κόσσος (*Cossus cossus*) -Ξυλοφάγα έντομα: Δόση: **150-312,5** κ.εκ. σκευάσματος /στρέμμα, **100-125** κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη μετά από 15 ημέρες.

ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΔΗ: Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρεπ Φρουτ: -Ψευδόκοκκος (*Pseudococcus citri*), -Κόκκινη ψώρα (*Aonidiella aurantii*) -Λεκανίο (*Saissetia oleae*) -Ασπιδιώτης (*Aspidiotus nerii*) -Ισέρια (*Icerya purchasi*) -Μυτιλόμορφη ψώρα (*Lepidosaphis beckii*) -Λοιπές ψώρες -Θρίπες (*Thrips spp.*) -Αφίδες (*Aphis spiraeola*) -Ανθοτρήτης (*Prays citri*): Δόση: **200-500** κ.εκ. σκευάσματος /στρέμμα, **100-125** κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ψεκασιών μετά από 15 ημέρες. Για τα κοκκοειδή οι ψεκασμοί διενεργούνται από Ιούνιο-Σεπτέμβριο, πριν τα νέα άτομα εγκατασταθούν στον καρπό.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά, Κιούνια: -Καρπόκαψα (*Cydia pomonella*), -Ανθονόμος (*Anthonomus pomorum*, *A. piri*) -Υπονομευτής (*Hyponomeuta malinellus*, *H. padellus*) -Σαν Ζοζέ (*Quadraspidiotus perniciosus*) -Βαμβοκάδα (*Diaspis pentagona*) -Ματόψευρα (*Eriosoma lanigerum*) -Φυλλορυκτές (*Phyllonorycter blancardella*, *P. corylifoliella*, *Cemiosoma scitela*, *Lyonetia clerkella*) -Ζευζέρα (*Zeuzera pyrina*) -Κόσσος (*Cossus cossus*) -Ξυλοφάγα έντομα: Δόση: **100-250** κ.εκ. σκευάσματος /στρέμμα, **100-125** κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Με την εμφάνιση της προσβολής, και επανάληψη μετά από 15 ημέρες.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Καρότα, Ραπάνια, Κρεμμύδια, Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες, Αγκινάρες: -Αφίδες (*Aphis spp.* *Myzus spp.*) -Θρίπες (*Thrips spp.*) -Πράσινο σκουλήκι (*Heliothis spp.*) -Περιίδα (*Pieris brassicae*): Δόση: **200-250** κ.εκ. σκευάσματος /στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη όπου χρειάζεται μετά από 15 ημέρες.

ΒΑΜΒΑΚΙ: -Πράσινο σκουλήκι (*Heliothis armigera*) -Ρόδινο σκουλήκι (*Pectinophora gossypiella*) -Σποντόπτερα (*Spodoptera exigua*) -Αφίδες (*Aphis gossypii*) -Θρίπες (*Thrips tabaci*): Δόση: **200-250** κ.εκ. σκευάσματος /στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων. Επόμενος ψεκασμός με την επανεμφάνιση των εντόμων σε 15 ημέρες.

ΠΑΤΑΤΑ: Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*) -Φθορμαία (*Phthorimaea operculella*) -Αφίδες (*Aphis spp.*): Δόση: **200-250** κ.εκ. σκευάσματος /στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη όπου χρειάζεται μετά από 15 ημέρες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ:
ΛΑΧΑΝΙΚΑ (αγγούρι, κολοκύθι, καρπούζι) **ΤΡΙΦΥΛΛΙ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΑΤΑΤΑ, ΣΙΤΑΡΙ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΚΑΠΝΟΣ:** Σιδηροσκώληκο (Agriotis spp.) -Υλέμια (Hylemyia antiqua) **καθολική εφαρμογή:** Δόση: **520** κ.εκ./στρέμ., **εφαρμογή σε λωρίδες ή αυλάκια: 200** κ.εκ./στρέμ., -Πρασόγγουρας (Gryllotalpa spp.) -Χλώροπας (Carabidae) -Ζάμπρος (Zabrus tenebrioides) **καθολική εφαρμογή:** Δόση: **200** κ.εκ./στρέμ., **εφαρμογή σε λωρίδες ή αυλάκια: 100** κ.εκ./στρέμ. Κορτοσκούληκο (Agriotis spp.) **καθολική εφαρμογή:** Δόση: **130** κ.εκ./στρέμ., **εφαρμογή σε λωρίδες ή αυλάκια: 80** κ.εκ./στρέμ.

Εφαρμογή: Πριν τη σπορά ή φύτεμα. Ομοιόμορφο ράντισμα και ενσωμάτωση στα 5-10 εκ.

ΣΠΟΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΣΠΟΡΕΙΑ: -Σιδηροσκώληκο (Agriotis spp.) -Υλέμια (Hylemyia antiqua) -Πρασόγγουρας (Gryllotalpa spp.) -Χλώροπας (Carabidae) -Ζάμπρος (Zabrus tenebrioides) -Κορτοσκούληκο (Agriotis spp.): 5 κ.εκ./ 10 τ.μ. Μετά τη σπορά. Εφαρμογή με το νερό του ποτιστικού.

ΚΑΠΝΟΣ, ΤΟΜΑΤΑ: -Σιδηροσκώληκο (Agriotis spp.)-Υλέμια (Hylemyia antiqua)-Πρασόγγουρας (Gryllotalpa spp.)-Χλώροπας (Carabidae) -Ζάμπρος (Zabrus tenebrioides) -Κορτοσκούληκο (Agriotis spp.): Δόση: **150** κ.εκ./στρέμ. Κατά το φύτεμα με το νερό του φυτεύματος.

ΠΑΤΑΤΑ: -Σιδηροσκώληκο (Agriotis spp.)-Υλέμια (Hylemyia antiqua)-Πρασόγγουρας (Gryllotalpa spp.)-Χλώροπας (Carabidae) -Ζάμπρος (Zabrus tenebrioides) -Κορτοσκούληκο (Agriotis spp.) Δόση: 200 κ.εκ./στρέμ. Κατά το φύτεμα. Ψεκασμός του εδάφους στις αυλακίες.

ΔΟΛΩΜΑΤΑ:
-ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: Κορτοσκούληκο (Agriotis spp.) & Πρασόγγουρα (Gryllotalpa spp.)
-ΔΟΣΗ: **100** κ.εκ./στρέμμα με 3 κλάπαιoura σε ένα λίτρο νερό και διασκορπισμός στη συνέχεια.
Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα):
-Ψεκασμός Φυλλώματος: Πυρηνόκαρπα **150-250**, Εσπεριδοειδή: **200-400**, Μηλοειδή: **100-200**, Λαχανικά: **50-80**, Βαμβάκι: **50-80**, Πατάτα: **50-80**.
-Εφαρμογή στο έδαφος: Λαχανικά (αγγούρι, κολοκύθι, Καρπούζι), Τριφύλλι, Βαμβάκι, Πατάτα, Σιτάρι, Καλαμπόκι, Καπνός: **50**
Μεγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:
-Ψεκασμός Φυλλώματος: 2 εφαρμογές για όλες τις καλλιέργειες.
-Εφαρμογή στο έδαφος: 1 εφαρμογή για όλες τις καλλιέργειες.

298X125