

ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΛ ΑΛΦΑ:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλλιψευας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με την μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά και αναδεύοντας προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΥΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΙΑ: Ωίδιο, Φουζικλάδιο. Δόση: **80-105 κ.εκ./100 λίτρα νερό**. Εφαρμόζεται στα στάδια πράσινης, ρόδινης κορυφής, πτώσης πετάλων και 10-15 ημέρες αργότερα (καρπίδιο). **ΑΧΛΑΔΙΑ-ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ:** Φουζικλάδιο. Δόση: **80-105 κ.εκ./100 λίτρα νερό**. Εφαρμόζεται στα στάδια πράσινης κορυφής, ρευσκής κορυφής, πτώσης πετάλων και 15-20 ημέρες αργότερα. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Δαμασκηνιά):** Ωίδιο. Δόση: **80-105 κ.εκ./100 λίτρα νερό**. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στην πτώση των πετάλων, η δεύτερη στην απόσπαση του κάλυκα και η τρίτη 20 ημέρες αργότερα. **ΑΜΠΕΛΙ:** Ωίδιο. Δόση: **45-65 κ.εκ./100 λίτρα νερό**. Βασική εφαρμογή την άνοιξη, όταν έχουν εκπτυχθεί 2-3 φύλλα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΙΔΗ (Αγγούρι-Κοκκύθι-Καρπούζι-Πεπόνι):** Ωίδιο. Δόση: **105-130 κ.εκ./100 λίτρα νερό**. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα. **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ:** Ωίδιο, Μελανή κηλίδωση. Δόση: **105-130 κ.εκ./100 λίτρα νερό**. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες. **ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ:** Σκωρίαση. Δόση: **105-130 κ.εκ./100 λίτρα νερό**. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): Μηλοειδή (100-200), Πυρηνόκαρπα (150-250), Αμπέλι (50-150), Κοκκυνοειδή-Τριανταφυλλιά-Γαρυφαλιά (50-100).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καθημερινή περίοδο: Κοκκυνοειδή-Τριανταφυλλιά-Γαρυφαλιά (5), Μηλοειδή (4), Πυρηνόκαρπα-Αμπέλι (3).

Παρατηρήσεις: 1) Η μικρή δόση συνιστάται για προληπτικές και η μεγάλη για θεραπευτικές εφαρμογές. 2) Στις καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνόκαρπων, αμπέλιου και κοκκυνοειδών υπό κάλυψη, να ακολουθούνται στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλοειδή-Πυρηνόκαρπα-Αμπέλι: **21 ημέρες**. Κοκκυνοειδή: **7 ημέρες**.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δε συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.

Myclobutanil

ΑΛΦΑ

4,5EW

Myclobutanil (Μυκλομπουτανίλ) 4,5%
Εναιώρημα, Λάδι σε νερό

Εγγυημένη σύνθεση: **Myclobutanil** 4,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 95,17% β/β
Αρ.Έγκρ.Κυκλοφ.: 60240/23.12.2008

**Διασυστηματικό
μυκητοκτόνο
με προστατευτική και
θεραπευτική δράση**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:
Dow AgroSciences B.V. - Ιταλία
Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Παρασκευαστής-Συσκευαστής-Διανομέας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555
Φαξ: 2111205559
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343
Τ.Κ. 57008 Ιωάνια
Τηλ.: 2310784931-6
Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Πλύντε τα χέρια και τα ακάθυστα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 125 Κ.ΕΚ.