

276,5x135 mm

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ρυζωτροφές • Όταν το χρησιμοποιείται μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε • Μην αναπνεύτε αέρια/αναθυμιάσεις από το σύνθημα • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με αρθρικό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή • Μην αδιεύστε το περιεχόμενο στην αποχέτευση • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου • Σε περίπτωση απυγήματος ή αν αισθανθείτε αδιάβεστα ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε την επικέτα αν είναι δυνατόν) • Να φοράτε μάσκα με φίλτρο κάτω την αναμένη φορτώση και εφαρμογή.
- Να φοράτε, κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή • Στην περίπτωση επαφής μετά τον ψεκασμό, ο γρήγορτος πρέπει να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία γάντια και μπότες • Το μικρό και ο περιεκτής του πρέπει να διατηθεί με ασφαλή τρόπο • Απορρύψτε τη διαθέσεις του στο περιβάλλον • Συμβούλευτετες τις δόσης/δεύτερο δεδομένων ασφαλειάς.

Για να αποφύγετε κίνδυνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λειρωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Επιπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλεστες αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάσπεσης: Προσκαλέστε εμέτο και μεταφέρετε τον παθόντα αμέσως σε πλήρειστερο νοσοκομείο. Μην χρηγείτε τίποτα και μη προκαλέστε εμετό στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση απυγήματος ή αν αισθανθείτε αδιάβεστα ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε την επικέτα αν είναι δυνατόν).

Αντίδοτο: Δεν υπαρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΗΤΗΡΙΑΣ: 210 7793777

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδρότινο περιβάλλον.

Μην ρυπαντείτε το νερό με το προϊόν τη γη συσκευασία του. Για να προστατεύστε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μιαν αφέκστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων από τα επιφανειακά υδάτα. Για να προστατεύστε μια στοχευμένα φυτά να αφήνετε μιαν αφέκστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τη γεωργική γη.

Συνθήκες για την αποκέντυση χρονική σταθερότητα του σκευασμάτος: Το σκευάσμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια πουλάχθηκε στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο έργου, δροσερού και καλά αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης προστατευμένο με το αέρασμα ήλιακω φως.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλενούνται υπό πίεση μετάλλιο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό έξτηλυμα (τα νέρα της ξεπλύματος ρίχνονται στο φεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προσηγούμενώς με τρυπήμα για τη διαφαίνωση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποθίνεται σε οπήμα σύλλογης για ανάκτηση ενέργειας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασύλλεκτικές χρήσεις: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗΣ: Πορτοκάλι, Μανταρινά, Λεμόνια, Γκρέιτ φρουτ, Λιμεττά, Φράστα

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκά, Κερασά, Ροδακινά, Βιούσινά, Δαμασκηνιά, 30 μέρες. ΜΗΛΟΕΙΔΗΣ: Μηλά, Αγκαδιά, Κυδωνά 30 μέρες. ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλά, Φουντουκά, Φιστικά, Καστανά, Καρούδια 30 μέρες. ΕΛΙΕΣ: 30 μέρες. ΑΜΠΕΛΗΣ: 30 μέρες. ΠΑΤΑΤΑ (Αποξήρωση στελέχων): 10 μέρες.

Χρονικό διάστημα αποφλέσεις μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου στην ζώωνα στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμαστεί το σκεύασμα: Η είσοδος του εργάτη στον αγρό συνιστάται να γίνεται 24 ώρες μετά την εφαρμογή. 10 μέρες για την εισοδο ζώωνα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:



Μακερέλη

MACKEREL 20 SL Ζιζανιοκτόνο

Πικνό διάλυμα (SL)

Δραστική ουσία: Diquat 20% β/ο (200 g/L)

(υπό μορφή diquat dibromide 37,4 % β/ο)

Βοηθητικές ουσίες 67,1 % β/β

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας : 70043/15-5-2013

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Επιβλαβές κατά την επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάσπεσης.

Τοξικό όταν εισπνέεται.

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.



ΤΟΞΙΚΟ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάτοχος της Άδειας: Sharda Europe b.v.b.a

Josef Mertensstraat 142
1702 Dilbeek, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γλυνού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ.: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsililon-agro.com
www.ypsililon-agro.com



Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Τρόπος δράσης: Μη εκλεκτικό μεταφυτωρικό ζιζανιοκτόνο επαφής (μη διασυστηματικό) για την καταπολέμηση μεγάλου εύρους ζιζανίων, ιδιαίτερα πλατύφυλλων. Χρησιμοποιείται και σαν αποφυλλωτικό σε συγκεκριμένες καλλιέργειες με σκοπό να διευκολυνθεί η συγκομιδή.

Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος εφαρμογών ανά καλλιέργεια περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα (ταχ)	κ.εκ./λίτρα ψεκ.	Όγκος ψεκ. υγρών λίτρα/στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Πορτοκάλι, Μανταρινά, Λεμόνια, Γκρέιτ φρουτ, Λιμεττά, Φράστα	Πλατύφυλλα ζιζανία	330-500	--	30 - 50	Διαλύστε 1 λίτρο προϊόν σε 100-200 κιλά καθαρό νερό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο φεκαστικό για μια καλή διαφρογή των ζιζανίων σε 2-3 στρέμματα.	1
ΡΟΔΑΚΙΝΑ,ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΚΕΡΑΣΑΙ, ΒΙΟΥΣΙΝΑ, ΔΑΜΑΣΚΕΤΙΚΗ ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλά, Αγκαδιά, Κυδωνά	Κουκούτα Cuscuta spp.	200 - 250	--	30 - 50	Ράντισμα των κηλίδων προσβολής και μιας περιμετρικής ζώνης ασφαλείας. Εάν η προσβολή είναι εκτεταμένη ράντισμα μετά την κοπή.	1
ΜΗΔΙΚΗ	Κουκούτα Cuscuta spp.	200 - 250	--	30 - 50	Ράντισμα των κηλίδων προσβολής και μιας περιμετρικής ζώνης ασφαλείας. Εάν η προσβολή είναι εκτεταμένη ράντισμα μετά την κοπή.	1
ΜΗΔΙΚΗ για σποροπαραγωγή	Αποξηράνση στελεχών πριν τη συγκομιδή	300 - 350	--	30 - 50	Φεκασμός 2 - 6 μέρες πριν τη συγκομιδή του σπόρου.	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η συνιστώμενη δόση είναι ανάλογη του στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων. Η μικρή δόση εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων ενώ η μεγάλη δόση εφαρμόζεται στα μεγαλύτερα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων.

2. Η χρήση στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στο αμπελέ θέρεται να γίνεται με κατευθυνόμενο φεκασμό των ζιζανίων αποφεύγοντας την επαφή των σταγονίδων του φεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα και τα άλλα πράσινα μέρη των δενδρών και του αμπελού.

3. Η χρήση για αποξηράνση πριν τη συγκομιδή στην μηδική επιτρέπεται μόνο σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή.

4. Η εναπομένουσα φυτική μάζα (σανός) καθώς και το υπέργειο τιμήμα της πατάτας να μην χρησιμοποιούνται για χωροταροφία.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος φεκασμός των ζιζανίων με φεκαστικό υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση. Φεκαστικό υγρό 30-50 λίτρα νερό στο στρέμμα. Με χειροκίνητο φεκαστήρα ο όγκος του νερού το λιγότερο 20 λίτρα/στρέμμα. Μπετ κύπως σκούπας. Η πίεση φεκασμού μέχρι 1 ατμόσφαιρα.

Τρόπος παρασκευής φεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του φεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός φεκαστικών μηχανημάτων: μετά τον φεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του φεκαστήρα με άφονο καθαρό νερό.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.