

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: •Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά. •Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. •Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. •Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. •Φοράτε κατάλληλα γάντια από PVC και συσκευή προστασίας ματιών - προσώπου. •Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. •Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης προκαλέστε εμετό μόνο εάν: 1.Ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. 2.Ιατρική βοήθεια δεν είναι άμεσα δυνατή. 3.Αν έχει καταποθεί μεγάλη ποσότητα. 4.Ο χρόνος που έχει περάσει από την κατάποση δεν υπερβαίνει την μία ώρα.

Καλέστε αμέσως γιατρό ή μεταφέρετε τον ασθενή στο νοσοκομείο. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. **Καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Ο ασθενής πρέπει να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Καλέστε αμέσως γιατρό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ: Το προϊόν είναι παρεμποδιστής της χοληνεστεράσης. Παρακολούθηση του αναπνευστικού, καρδιακού και κεντρικού νευρικού συστήματος. Συνεχής αιματολογικός έλεγχος (έλεγχος των ερυθρών αιμοσφαιρίων και της χοληνεστεράσης πλάσματος). Τακτικός Ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος (ECG monitoring). Συνιστάται ενδοτραχειακή διασωλήνωση και πλύση στομάχου, ακολουθούμενη από χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα. **Σε περίπτωση εμφάνισης σπασμών:** Διαζεπάμη: για ενήλικες 5-10mg ενδοφλεβίως έως πλήρους καταστολής, για παιδιά 2,5mg ενδοφλεβίως.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Θεϊκή ατροπίνη (για ενήλικες: δόση 2 έως 4mg επαναλαμβανόμενη κάθε 10 με 15 λεπτά για όσο είναι απαραίτητο). **ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** oximes (pralidoxime, obidoxime), succinylcholine, aminophylline.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

R 03 5900 11



1 λίτρο e

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Εγγ. σύνθεση: methiocarb 50% β/ο
Βοηθ. ουσίες: 55,2% β/β

Καρβαμιδικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

για την καταπολέμηση του Θρίπα της Καλιφόρνιας σε καλλιέργειες αμπελιού, πιπεριάς, αγγουριού και τριανταφυλλιάς.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

- Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
 - Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
- Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιπχνες.**
Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από αυτές.

Κάτοχος της έγκρισης:
Bayer CropScience AG, Γερμανία
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς, ABEE

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
14166/13.12.2006



Τ
ΤΟΞΙΚΟ



N
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: - Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.

- Διαλύουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.

- Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπο πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωσή ή ανάκτηση ενέργειας. Μην ψεκάζετε αντίθετα προς τον άνεμο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Καρβαμιδικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση του Θρίπα της Καλιφόρνιας σε καλλιέργειες αμπελιού, πιπεριάς, αγγουριού και τριανταφυλλιάς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Αμπέλι: Θρίπας Καλιφόρνιας (*Frankliniella occidentalis*). Χρόνος εφαρμογής: με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση σκευάσματος:** 200κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (200 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

Πιπεριά (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Θρίπας Καλιφόρνιας (*Frankliniella occidentalis*). Χρόνος εφαρμογής: πριν την άνθιση. **Δόση σκευάσματος:** 200κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (200-300 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα.

Αγγούρι (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Θρίπας Καλιφόρνιας (*Frankliniella occidentalis*). Χρόνος εφαρμογής: πριν την άνθιση. **Δόση σκευάσματος:** 200κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (300-400 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150-200 λίτρα/στρέμμα.

Τριανταφυλλιά: Θρίπας Καλιφόρνιας (*Frankliniella occidentalis*). Χρόνος εφαρμογής: με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση σκευάσματος:** 200κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (200 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ:

Αμπέλι, Πιπεριά (υπαίθρου & θερμοκηπίου), Αγγούρι (υπαίθρου & θερμοκηπίου), Τριανταφυλλιά: 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στην περιοχή που ψεκάστηκε πριν περάσουν 48 ώρες. Για τις γεωργικές εργασίες και για διάστημα 96 ωρών από τον ψεκασμό, πριν εισέλθετε στην περιοχή να βάλετε προστατευτικά ρούχα και να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνηθισμένες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Σταφύλια (επιτραπέζιες και οиноποιήσιμες ποικιλίες): 42 ημέρες. Πιπεριά, Αγγούρι: Μη εφαρμόσιμο. Εφαρμογές πριν την άνθιση.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται σε χώρο δροσερό, ξηρό και χωρίς να εκτίθεται απ' ευθείας στο φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100



Bayer CropScience