



Μιλντεξ WG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του Περονόσπορου στο Αγγούρι, το Πεπόνι, το Καρπούζι, το Καπνό, το Μαρούλι και το Αμπέλι.
Το fenamidone είναι εκλεκτικό μυκητοκτόνο επαφής της ομάδας των Qols (των μιδαζολινών) με διελασματικές ιδιότητες και προληπτική κυρίως δράση. Δρα παρεμποδίζοντας το σχηματισμό και τη βλάστηση των ζωοσπορίων καθώς και την ανάπτυξη του μυκηλίου, παρεμποδίζοντας την αναπνευστική λειτουργία στο σύμπλοκο III.
Το fosetyl-Al, ανήκει στις φωσφονικές ενώσεις, παρουσιάζει συμπλαστική και αποπ्लाστική κίνηση και δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ψεκάσμός καλύμμεως φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Αμπέλι: Περονόσπορος (*Plasmopara viticola*). Εφαρμογές με την έναρξη της προσβολής. **Δόση:** 250 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (250γρ. / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.
Καπνός: Περονόσπορος (*Peronospora tabacina*). Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. **Δόση:** 280-320 γρ./ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 80-100 λίτρα/ στρέμμα.
Αγγούρι (Υ&Θ), Πεπόνι(Υ&Θ),Καρπούζι(Υ&Θ): **Περονόσπορος** (*Pseudoperonospora cubensis*). Εφαρμογές

με την έναρξη της προσβολής. **Δόση:** 225-250γρ/100λίτρα ψεκ.υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα /στρέμμα (Υ), 100-150 λίτρα/στρέμμα (Θ).
Μαρούλι: Περονόσπορος (*Bremia lactucae*). Εφαρμογές από την εμφάνιση του τρίτου πραγματικού φύλλου μέχρι το τέλος της ανάπτυξης του φυλλώματος. **Δόση:** 225-250γρ/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 15-100 λίτρα /στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:
Αμπέλι: Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.
Καπνός: Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8-14 ημέρες.
Αγγούρι (Υ&Θ), Πεπόνι(Υ&Θ),Καρπούζι(Υ&Θ): Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.
Μαρούλι: Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8-10 ημέρες.

Παρατηρήσεις:
• **Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος MILDEx WG.**
• Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Αμπέλι: 28 ημέρες,
Καπνός: 30-40 ημέρες,
Αγγούρι (Υ&Θ), Πεπόνι(Υ&Θ),Καρπούζι(Υ&Θ): 3 ημέρες,
Μαρούλι: 14 ημέρες

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη



διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.
Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος, πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
• Εφαρμόστε το Mildex WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
• Εφαρμόστε το Mildex WG σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
• **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 για το αμπέλι και 3 για τις άλλες καλλιέργειες.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική κλειστή συσκευασία του σε συνθήκες συνθήκες αποθήκευσης.



Καθ. βάρος 500γρ. €

Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)
Εγγ. Σύνθεση: fenamidone: 4,44% β/β + fosetyl-Al: 66,7% β/β
Βοηθ. ουσίες: 25,97% β/β

Αριθ. Έγκ. Κυκλ.Υ.Α.Α.Τ.: 60.251/17.02.2009

Μυκητοκτόνο

για την καταπολέμηση του Περονόσπορου στο Αγγούρι, το Πεπόνι, το Καρπούζι, τον Καπνό, το Μαρούλι, και το Αμπέλι.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE



Bayer CropScience

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100

Διανομέας:



K&N. Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
B' Εισοδός
Τ.Κ. 550 22 Σίνδος
Τηλ, κέντρο: 2310 568656, Fax: 2310 798423



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε τη λευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από σύγχημα: • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. • Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Πληροφορίες για το γιατρό: Ιατρική παρακολούθηση για 48 ώρες τουλάχιστον. Θεραπευτική αγωγή.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 7793777

ΠΟΛΥΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προσπατήσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αιψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων για την καλλιέργεια αμπελιού και 5 μέτρων για τις υπόλοιπες καλλιέργειες από σώματα επιφανειακών υδάτων.

N03593611