

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευθεί στην αρχική του συσκευασία, σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Ημερ. Παρασκευής-Ημερ. Λήξης-Αρ. Παρτίδας:

Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και τον ψεκασμό. Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών-προσώπου. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη ζώνη. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική βοήθεια.

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Στη συνέχεια ζητείστε ιατρική συμβουλή. **ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Πλύντε τα με άφθονο νερό και ζητείστε τη συμβουλή ειδικού.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια. **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή την συσκευασία του.

Διανομέας:
Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100



Bayer CropScience



Prosper[®]

spiroxamine (σπιροξαμίν) 50%
Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο

500 EC

Εγγ.Σύνθεση: spiroxamine 50% β/ο
Βοηθ.ουσίες: 47% β/β

Κάθ. βάρος 500κ.εκ.

Αρ.Εγκρ. Κυκλ. Υπ. Γεωργίας
6771 / 14.01.2003

Διασυστηματικό Μικητοκτόνο
για την αντιμετώπιση του υιδίου της αμπέλου.

ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

- Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης
- Ερεθίζει το δέρμα
- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

Κάτοχος της έγκρισης, υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ABEE

Χη



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ- ΔΟΣΙΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμα-Επιτραπέζια): Ωίδιο της αμπέλου (Uncinula necator) Δόση εφαρμογής: 60 κ.εκ.σκευάσματος/ 100λίτρα νερό.

Ποσότητα ψεκαστικού υγρού / στρέμμα: 100 λίτρα.

Χρόνος εφαρμογής: Προληπτική εφαρμογή στο στάδιο των 2-3 φύλλων λίγο πριν την άνθηση και μετά το δέσιμο και σε εναλλαγή με μικητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

Τρόπος δράσης:

1.Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση εργοστερόλης με τρόπο διαφορετικό από εκείνου των DM's.

2.Παρουσιάζει βραδεία αποπλαστική κίνηση στα φυτά, στα οποία διασώζει ταχύτητα και για αυτό δεν επηρεάζεται η δράση του από βροχόπτωση, δύο ώρες μετά την εφαρμογή του.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού και η πίεση ψεκασμού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται καλή διαβροχή φυλλώματος.Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Αραιώνουμε το προϊόν σε λίγο νερό. Στη συνέχεια αδειάζουμε το μίγμα στο μισογεμισμένο με νερό βυτίο με συνεχή ανάδευση και απογεμίζουμε το βυτίο με νερό. **Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 7-12 ημέρες όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου και 13-16 ημέρες όταν ο κίνδυνος προσβολής είναι μικρός.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Επιτραπέζια σταφύλια: 14 ημέρες - Οινοποιήσιμα σταφύλια: 35 ημέρες.

Διαχείριση της ανθεκτικότητας:

Ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας του μύκητα *Uncinula necator* (ωίδιο της αμπέλου) στο Prosper 500 EC (spiroxamine 50%) κάτω από ορισμένες συνθήκες, είναι υπαρκτός. Για την πρόληψη εμφάνισης φαινομένων ανθεκτικότητας στην πράξη, πρέπει να εφαρμόζεται η χρήση του spiroxamine μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μικητοκτόνα άλλων χημικών ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: τέσσερις (4).

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα Bulldock 025SC (betacyfluthrin), Folidol M 400 EC (parathion methyl). Δεν συνδυάζεται με τα Antiracal Combi 67WP (propineb + triadimefon), Cascade 10DC (flufenoxuron), Ridomil-MZ (7,5+56) WP (metalaxyl-mancozebe), Folicur 250 EW (tebuconazole).

Προτεινόμενα MRL's για το spiroxamine:

Αμπέλι: Επιτραπέζια - Οινοποιήσιμα σταφύλια: 1,0 mg/ Kg
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση προϊόντων / συσκευασίας: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος, πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Καθαρισμός ψεκαστήρα, πλύσιμο των ψεκαστικών μέσων: Πρέπει να γίνεται σε αψέκαστη περιοχή του αμπελώνα όπου χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα ή σε ειδικό χώρο για πλύσιμο με τοιμενένιο δάπεδο και συλλογή των εκπλυμάτων σε ειδική δεξαμενή. Το πλύσιμο γίνεται με 3 ξεπλύματα του βυτίου και των μερών του ψεκαστήρα με νερό.



5 200309 894217