



ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το RUNNER 240 SC συνδυάζεται με τα παρακάτω σκευάσματα: Flint 50 WG, Prosper 500 EC, Bayfidan 250 EC, Melody Med, Melody Compact, Antracol combi X, Teldor WG, Mesural WP, Confidor 200 SL, Accel, Diametan, Allette 80 WG, Antracol 65 WP, Follicur EW, R6 Erresei, Euparen M 50 WG, Reldan, Laser.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να γίνει καλή διαβροχή του φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με σχίσιο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το RUNNER 240 SC είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των διακυλυδραζινών.

Καταπολέμει τις προνύμφες των λεπιόπτερων σε εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, μανταρίνια), μηλοειδή (μήλα, αχλαδιά), πυρηνόκαρπα (βερκόκα, ροδάκινα, νεκταρίνια), αμπέλι και τοιάτες & πιπεριές θερμοληπτικού.

Το methoxyfenozide είναι ρυθμιστής της ανάπτυξης των εντόμων και δρά ως μιμητικό της ορμόνης έκδυσης της εκδυσόνης, στις προνύμφες των λεπιόπτερων. Λόγω της δόσμησης του methoxyfenozide στη θέση-δέκτη της εκδυσόνης, προκαλείται πρώιμη και ατελής έκδυση, με αποτέλεσμα το θάνατο του εντόμου.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια/Μανταρίνια): 2

Μηλοειδή (Μήλα, Αχλαδιά): 3

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερκοκιά): 3

Αμπέλι (επιτραπέζια, οиноποιήσιμα, και σταφίδες): 4

Τομάτα Πιπεριά (Θερμοληπτικού): 3

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια/Μανταρίνια):

Φυλλοκνίστης (*Phyllocnistis citrella*): Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, στοχεύοντας στους νέο-εκπτυσσόμενους βλαστούς. Μίγμα με θειικό πολτό σε δόση 300-500 ml/hl. Μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες. **Δόση:** 40κ.εκ./100λτ. νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200 λτ/στρέμμα.

Μηλοειδή (Μήλα, Αχλαδιά):

Καρπόκαψα (*Carposcapa pomonella*), Φυλλοδέτης (*Adoxophyes orana*), Φυλλορύκτες (*Lithocolletis* sp.- Δευτερεύουσα δράση): Πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη της εναπόθεσης των ωών (περίπου 7 ημέρες από την έναρξη της σύλληψης των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Μεσοδιάστημα εφαρμογής: 14 - 21 ημέρες. **Δόση:** 40κ.εκ./100λτ. νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-180 λτ/στρέμμα.

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερκοκιά): Φυλλοδέτης (*Adoxophyes orana*): Πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη της εναπόθεσης των ωών (περίπου 7 ημέρες από την έναρξη της σύλληψης των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Μεσοδιάστημα εφαρμογής: 14 - 21 ημέρες. **Δόση:** 40κ.εκ./100λτ. νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-180 λτ/στρέμμα.

Αμπέλι (Ποικιλίες επιτραπέζιας, οиноποιήσιμες, και σταφίδες) Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*, syn. *Polychrosis botrana*): Πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη της εναπόθεσης των ωών (περίπου 7 ημέρες από την έναρξη της σύλληψης των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Μεσοδιάστημα εφαρμογής: 14 - 21 ημέρες. **Δόση:** 40κ.εκ./100λτ. νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-125 λτ/στρέμμα.

Τομάτα-Πιπεριά (Θερμοληπτικού) Σποντόπτερα (*Spodoptera* sp.): Εφαρμογή με την εμφάνιση τη προσβολής. Μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 - 21 ημέρες. **Δόση:** 40κ.εκ./100λτ. νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λτ/στρέμμα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο.

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

• Για την ίδια καλλιεργητική περίοδο σε μια καλλιέργεια το RUNNER πρέπει να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης

• Αποφύγετε την διαδοχική χρήση του RUNNER σε καλλιέργειες που έχει ήδη γίνει εφαρμογή με σκευάσματα που περιέχουν tebufenozide (MIMIC)

• Χρησιμοποιείστε όλες τις δυνατές καλλιεργητικές τεχνικές καθώς και φυσικές και βιολογικές μεθόδους για τον έλεγχο των εχθρών (παρακολούθηση των πτήσεων των ενηλίκων και προστασία των ωφελίων αρθροπόδων) έτσι ώστε να μειωθεί η ασκούμενη πίεση επιλογής για ανθεκτικότητα, από τις εφαρμογές εντομοκτόνων.

• Αποφύγετε την εφαρμογή του RUNNER σε περισσότερες από 2 με 3 συνεχόμενες γενιές των εχθρών στόχων κατ' έτος.

• Αποφύγετε την χρήση εντομοκτόνων της ομάδας των διακυλυδραζινών για την εξάλειψη εκτεταμένης μη ελεγχόμενης προσβολής.

Διανομέας:

Bayer Ελλάς ABEE
Συγγρού 19-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100

Bayer CropScience



ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Το Runner 240 SC δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Μηλιά, Αχλαδιά: 14, Εσπεριδοειδή: 14, Βερκοκιά, Ροδακινιά,

Νεκταρινιά: 7, Τομάτα: 1, Πιπεριά: 1,

Αμπέλι: Οиноποιήσιμα: 14, Επιτραπέζια: 7, Σταφίδα: 7.

Το φυτοπροστατευτικό προϊόν Runner 240 SC μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε προγράμματα IPM (Integrated Pest management).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από τα παιδιά. • Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. • Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την επκέτα. • Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένου ασφαλείας. • Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη για τους οπωρώνες και 5 μέτρα για τα αμπέλια και τα λαχανικά αγρού. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων μέχρι τα σώματα των επιφανειακών υδάτων για τους οπωρώνες. • Προκειμένου να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα μην χρησιμοποιείται αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει διακυλυδραζίνες περισσότερες από 2 με 3 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 5 λεπτά τουλάχιστον και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση εισπνοής μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό. Μην χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και μη προκαλέσετε εμετό σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς. Ειδικό αντιδοτο δεν υπάρχει. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

N 12 7817 05

