

# Sencor



**Σένκορ**  
70 WG  
metribuzin

## ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΖΙΖΑΝΙΑ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Σένκορ 70 WG εφαρμόζεται πριν ή μετά το φύτρωμα τόσο των καλλιεργειών, όσο και των ζιζανίων. Ο τρόπος εφαρμογής εξαρτάται από την ποικιλία, από το σπορείο στο χωράφι, οπότε πρέπει οι τομάτες να έχουν "ριζοπάσθια" και να έχουν 3-4 πραγματικά φύλλα. Πρέπει επίσης να ριζοπάσουν και τα "κεντρώματα" (φυτά που αντικαθίστανται από πλεονεκτικά φύλλα).

Ψεκάζεται όλη η επιφάνεια ή τα "σαμάρια" μετά το ριζόπισμα και στα αυλάκια μετά το παράχωμα.

Δόση: 40 γρ./στρέμμα. Όταν εφαρμόζεται στα "σαμάρια" και στα αυλάκια η δοσολογία μειώνεται ανάλογα με την φεκαζόμενη επιφάνεια.

Ποικιλίες: Συνιστάται για εφαρμογές (προφυτωτικά-μεταφυτωτικά) στις παρακάτω ποικιλίες: Roma V.F., Super Roma, Super California, Roma Nova, Ventura, Napoli V.F., Red River, CAL J. Campbell 30, Perlita, Petomec, Heinz 1706, AT 70/14 TOKO-7, ES 58, VF 65, VF 189, Europemek, ACE-65, Early Pack-7, Στην ποικιλία Fantastic η εφαρμογή γίνεται μόνο στα αυλάκια, χωρὶς να βρέχονται τα τοματόφυτα. Το Σένκορ 70 WG μπορεί να χρησιμοποιείται και στις υπόλοιπες ποικιλίες τομάτας σε δοσολογία 30 γραμ./στρέμμα και με εφαρμογή μόνο με φεκατόπικο μετάριχα ή φεκατόρια πλάτη και μπεκ τύπου οκούπας".

**ΜΗΔΙΚΗ**  
Εφαρμόζεται κατά την περίοδο του ληθάρου της μηδικής (κατά το χειμώνα) σε δοσολογία 75-100 γρ./στρέμμα.

**Β) Μεταφυτωτικά:** Το Σένκορ 70 WG εφαρμόζεται μετά το φύτρωμα της πατάτας μέχρι ύψος φυτών 5-10 εκ. Συνιστάται στις ποικιλίες Arran-Banner, Kenepekk, Claustar, Sebago, Spuda, Marfona, Blanca, Ausonia, Enzina, Arcula, Concurrent, Hermes, Crista, Mondial, Timate. Δόση: 50 γρ./στρέμμα.

**ΤΟΜΑΤΕΣ**  
**1. Σπαρτές στο χωράφι:**  
α) Προφυτωτικά: Εφαρμόζεται αμέσως μετά τη σπορά μέχρι να κεντρώσουν οι σπόροι.

Δόση: 40 γρ./στρέμμα.

β) Μεταφυτωτικά: Εφαρμόζεται όταν οι τομάτες έχουν 2-4 πραγματικά φύλλα μετά το αυλάκωμα ή το οχήματομά τραπεζιών. Δόση: 40 γρ./στρέμμα.

Διανομέας:  
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι  
Τηλ: 210 6166000  
Fax: 210 6109100

Bayer CropScience

**Σένκορ**  
70 WG  
metribuzin

## ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

60 ημέρες.

### ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Πλατύφυλλα: Βλήτα (Amaranthus spp.), Λουσουδά (Chenopodium album), Λαψύνα (Lapsana communis), Ζώχος (Sonchus spp.), Περδικούλι (Parietaria spp.), Ανθειάς (Anthemis arvensis), Σκυλάκι (Antirrhinum spp.), Αγριοκαρδαμούδια (Lepidium spp.), Τάστουλας (Datura stramonium), Λάδιο (Lamium spp.), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), Κενταύριο (Centaurea cyanus), Χαμομήλι (Matricaria chamomilla), Σκαρολάχανα (Mercurialis annua), Οξάλης (Oxalis spp.), Πλαταρόνια (Papaver rhoeas), Πολικούμπι (Polygonum aviculare), Αντράκια (Portulaca oleracea), Μαρτιάκος (Senecio vulgaris), Αγριοσινάπι (Sinapis arvensis), Σαπουνόχορτο (Vaccaria pyramidata), Αγριοροδάκι (Tarraxacum officinale), Τσουκιδά (Urtica spp.), Βερούνικη (Veronica spp.), Πικραλίδια ή Χιοροβότανο (Picris spp.), Αγκάθι (Xanthium spp.). Στενόφυλλα: Άλειτονούρια (Alopecurus myosuroides), Βραχιάρα (Bracharia spp.), Κομελίνα (Commelinia spp.), Νεραγιάρδα ή Αματόχορτο (Digitaria sanguinalis), Μουρχίτα (Echinochloa crus-galli), Ελευθερία (Eleusine spp.), Ήρα (Lolium spp.), Πύλα (Poa spp.), Σετάρια (Setaria spp.). Δεν καταπολεμούνται ζιζάνια:

Αγριοβρύωμα (Avena spp.), Κίρισμα (Cirsium spp.), Μεγάλη Καλλητεΐδα (Galium aparine), Μολύχα (Malva spp.), Στύφωνος (Solanum nigrum).

### ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Το Σένκορ 70 WG έχει αποδειχθεί καλά ανεκτό στις καλλιέργειες και ποικιλίες που αναφέρονται παραπάνω. Για εφαρμογές σε άλλες ποικιλές επέκτασης απαιτείται δοκιμή φυτοτοξικότητας σε μικρή έκταση.

### ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 18 μήνες.

**Ημερ. Παρασκευής-Ημερ. Λήμης:** Βλέπε στο καπάκι του κουπιού.  
**Αρ. Παρτίδας:** Βλέπε εσωτερική σακκούλα.



5 200309 894620

**Sencor**  
70 WG  
metribuzin (μετριμπουζίν) 70%  
Εναιωρηματοποιήσμοι κόκκι

Εγγ. Σύνθεση: metribuzin 70% β/β  
Βοηθ. ουσίες: 22,23% β/β

Αρ. Εγκρ. Κυκλ. Υπ. Γεωργίας  
7068/28-2-80/87

Καθ. βάρος 500γρ. e

### ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

για την καταπολέμηση πλατυφύλλων και στενοφύλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες πατάτας, τομάτας, μηδικής, σόγιας, καρώτου, σπαραγγιού.

### ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

• Πολύ τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδατόντον περιβάλλον

### Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες



Χη

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ  
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παρασκευαστής-Τυποποιητής:  
Bayer CropScience AG, Γερμανία  
Αντιπρόσωπος-Συσκευαστής:  
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Μαρούσι  
Εργοστάσιο: Υπατο Θηβών

### ΕΙΑΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. Χρηματιστείτε χωριστά φεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοτόνα. Η αποκοδομητή του Σένκορ 70 WG στο εδάφος γίνεται μέχρι τη συγκομιδή της καλλιέργειας. Είτε στην η εφαρμογή γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, δεν υπάρχει κίνδυνος ζημιών στην επόμενη καλλιέργεια. Όταν για διάφορους λόγους γίνεται "χάλασμα" (δρυμά, γύρισμα) της καλλιέργειας, τότε μπορεί να καλλιέργεψε πάντα περιοδικά ποτάτα, τομάτα και καλαμπόκι (μετά το όργανο του χωραφιού).

Δεν ένδεικνει τη εφαρμογή του Σένκορ 70 WG σε αμώμων εδάφη ή σε εδάφη με περιεκτικότητα σε χούμο μεγαλύτερη από 6%. Μην μολύνετε αρδευτικά ή πόσιμα νερό και γειτονικές ενασθήτης καλλιέργειες. Αν μολύνουν τα νερά αρδεύσωντας, να μην χρηματοποιηθούν. Μην ψεκάζετε δύο φυσών. Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην εξανέντετε τις δόσεις. Ψεκάζετε με πάντα 2-3 αποφραγμών. Χρηματιστείτε μετά το ποτάτα. Μην για χρηματοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα φεκαστικά μέσα με νερό. Ακολουθεί πετύσιμο με σάδη.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και χωτροφέρεις. Κατά τα θερινούς μήνες αποφεύγετε να φεκάζετε τις ζεστές ώρες της ημέρας. Αποφεύγετε την εισιτονή του προϊόντος ή των σταγονιδίων του φεκασμού. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφεύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβολευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:** Σε περίπτωση στυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του αυτή τη συσκευασία. Ειδικό αντιδότο δεν υπάρχει.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσων: 210 7793 777.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΠΑΓΙΔΑΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

N 07 8343 05