

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Μην αναπνέετε αέρα, αναθυμιάσεις, καπνούς ή εκνεφώματα. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. •Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή. **Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία**, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). **Σε περίπτωση εισπνοής**, μετακινήστε τον παθόντα σε καλή αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάποσης**, ζητήστε επείγοντως ιατρική βοήθεια. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα**, αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και ξεπλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος, που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα, με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια**, ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. **Αντίδοτο:** Θεϊκή Ατροπίνη και εάν είναι δυνατό σε συνδυασμό με Τοχογονίνη ή PAM. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
ΒΛΑΒΕΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξεπλύματα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο σύστημα άρδευσης) και αφού καταστραφούν προηγούμενος με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

07/2013-2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



Nemacur[®] 240CS

Fenamiphos (Φεναμιφός) 24%
Κάψουλες σε εναιώρημα

Εγγυημένη σύνθεση: **Fenamiphos 24% β/ο**
Βοηθητικές ουσίες: 75,42% β/β
Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Φ.: 3029/17.01.2002

**Διασυστηματικό νηματωδοκτόνο που δρα και
δι'επαφής. Εφαρμόζεται σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες
μέσω της στάγδην άρδευσης.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε περιοχές που έχουν άμεση γειτνίαση με επίγεια
(θήμνες, ποτάμια) ή υπόγεια (άντλησης) αβαθή νερά
Προορίζεται μόνον για επαγγελματίες χρήστες

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Μέλος του



Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την
τελική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαϊλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάνια
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

ΝΕΜΑΚΟΥΡ 240:

Διασυστηματικό νηματωδοκτόνο που δρα και δι'επαφής. Εφαρμόζεται μόνο στο έδαφος μέσω της στάγδην άρδευσης σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή στο έδαφος με τη στάγδην άρδευση, σε εγκατεστημένα θερμοκήπια. Η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αραιώνεται σε μικρή ποσότητα νερού και προστίθεται στο σύστημα άρδευσης με τη χρήση δοσομετρητή. Εφαρμόστε το αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος. Ξεπλύνετε καλά το σύστημα άρδευσης πριν και μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΠΑΝΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: Νηματώδεις. Δόση: 8,3-16,5 κ.εκ./συστάδα. Εφαρμόζεται γύρω από κάθε συστάδα σε διάμετρο 50-70 εκ. με το σύστημα της στάγδην άρδευσης, μετά τη φύτευση και στη συνέχεια την άνοιξη και το φθινόπωρο, εφόσον υπάρχει πρόβλημα. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (Τομάτα-Μελιτζάνα-Πιπεριά-Πεπόνι-Καρπούζι):** Νηματώδεις. Δόση: 1,6 λίτρα/στρ. Με το σύστημα στάγδην άρδευσης. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ:** Νηματώδεις. Δόση: 4,2-15 κ.εκ./τ.μ. Με το σύστημα της στάγδην άρδευσης. **ΦΥΤΩΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (για τις εγκεκριμένες καλλιέργειες).** Δόση: 4,2 κ.εκ./τ.μ. Πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση, με το σύστημα της στάγδην άρδευσης.

Παρατήρηση: Την εφαρμογή του σκευάσματος με το σύστημα της στάγδην άρδευσης ακολουθεί πότισμα μικρής διάρκειας για την ενσωμάτωσή του.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 60 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις, καλλιέργειες και τρόπο εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Να μην εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.