

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Μην αναπνέετε αέρια, αναθυμιάσεις, καπνούς ή εκνεφώματα. •Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). **Σε περίπτωση εισπνοής:** μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάποσης:** ζητήστε επείγοντως ιατρική βοήθεια. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και ξεπλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος, που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα, με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Αντιδοτό:** Θεϊκή στρόνινη και εάν είναι δυνατόν σε συνδυασμό με PAM ή TOXOGONIN.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΑΝΤΑ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΦΕΡΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΑΝΘΙΣΜΕΝΑ ΦΥΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΑΝΘΙΣΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ
ΒΛΑΒΕΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά υλικά συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο σύστημα άρδευσης) και, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



09/2013-2



Nemacur® 40EC

Fenamiphos (Φεναμφός) 40% Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο

Εγγυημένη σύνθεση: **Fenamiphos 40% β/ο**
Βοηθητικές ουσίες: 58,77% β/β
Αρ. Έγκρ.Κυκλ.οφ.: 1433/26.2.80

Διασυστηματικό νηματωδοκτόνο που δρα και δί'επαφής. Εφαρμόζεται μόνο στο έδαφος.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές, σε περιοχές που έχουν άμεση γειτνίαση με επίγεια (ρίγνες, ποτάμια) ή υπόγεια (άντλησης) αβαθή νερά
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

**ΤΟΞΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΕΥΦΛΕΚΤΟ**



ΤΟΞΙΚΟ

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τεχνική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΒΕ
Εθνική Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559
Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Μέλος του



ΝΕΜΑΚΟΥΡ:

Διασυστηματικό νηματωδοκτόνο που δρα και δί'επαφής. Εφαρμόζεται μόνο στο έδαφος.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Μία (1) εφαρμογή με τη στάγδην άρδευση σε εγκατεστημένα θερμοκήπια. Η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αραιώνεται σε μικρή ποσότητα νερού και προστίθεται στο σύστημα άρδευσης με τη χρήση δοσομετρητή. Εφαρμόστε το αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος. Ξεπλύνετε καλά το σύστημα άρδευσης πριν και μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΠΑΝΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: Νηματωδείς. Δόση: 5-10 κ.εκ./συστάδα. Εφαρμόζεται γύρω από κάθε συστάδα σε διάμετρο 50-70 εκ. με το σύστημα της στάγδην άρδευσης, μετά τη φύτευση και στη συνέχεια την άνοιξη και το φθινόπωρο, εφόσον υπάρχει πρόβλημα. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (Τομάτα-Πιπεριά-Μελιτζάνα-Πεπόνι-Καρπούζι):** Νηματωδείς. Δόση: 1 λίτρο/στρ. Πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση με το σύστημα της στάγδην άρδευσης. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ:** Νηματωδείς. Δόση: 2,5-9 κ.εκ./τ.μ. Πριν τη φύτευση με το σύστημα της στάγδην άρδευσης. **ΦΥΤΩΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (για τις εγκεκριμένες καλλιέργειες).** Νηματωδείς. Δόση: 2,5 κ.εκ./τ.μ. Πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση, με το σύστημα της στάγδην άρδευσης.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 60 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Στις συνιστώμενες δόσεις, καλλιέργειες και τρόπο εφαρμογής δεν είναι φυτοτοξικό.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗ- ΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Χρησιμοποιείται στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από παγετό και σε θερμοκρασία <40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.